


# اطنیز



## في الرياضيات

تاج جرد زاکرولی علی  
فیسبوک  
توپنر  
جوجل بلس  
تلگرام

=

+

>

<

الصف الخامس الابتدائي  
الفصل الدراسي الثاني

# أعداد : ألمد الشتوري

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أحمد الله و اشكره و أثني عليه أن أعانتى  
و وفقى لتقديم هذا الكتاب من مجموعة  
"المتميز"


في الرياضيات لأقدمه لأبنائى المتعلمين  
و إخوانى المعلمين و الذى راعيت فيه  
تقديم المادة العلمية بطريقة مبسطة و ممتعة  
مدللاً بأمثلة محلولة ثم تدريبات متنوعة و متدرجة  
للتدريب على كيفية الحل لتناسب كل المستويات  
و مرافق حلولها كاملة في آخر الكتاب  
متمنياً أن ينال رضاكم و ثقتم التى أعزز بها  
و والله لا يضيع أجر من أحسن عملا  
و هو ولى التوفيق

أحمد التنتوى

## المحتويات

- \* الوحدة الأولى : الأعداد الطبيعية
  - \* الدرس الأول : مجموعة الأعداد الطبيعية
  - \* الدرس الثاني: بعض المجموعات الجزئية من ط
  - \* الدرس الثالث : ترتيب و مقارنة الأعداد الطبيعية
  - \* الدرس الرابع : العمليات على الأعداد الطبيعية
  - \* الدرس الخامس : الأنماط العددية
- الوحدة الثانية : المعادلات
- \* الدرس الأول : التعبيرات الرياضية
  - \* الدرس الثاني : الثابت و المتغير
  - \* الدرس الثالث : المعادلات
- الوحدة الثالثة : القياس
- \* الدرس الأول : المساحة و حداتها
  - \* الدرس الثاني : مساحة متوازى الأضلاع
  - \* الدرس الثالث : مساحة المربع  
بمعلومات طول قطره
  - \* الدرس الرابع : مساحة المعين  
بمعلومات طولاً قطره
  - \* الدرس الخامس : محيط الدائرة
- الوحدة الرابعة : التحويلات الهندسية  
الانعكاس
- \* الدرس الأول : الأشكال المتماثلة و محور التماثل
  - \* الدرس الثاني: تحديد مواضع أعداد على شعاع  
تحديد مواضع نقطة في المستوى الابداى
- الوحدة الخامسة : الإحصاء
- \* الدرس الأول : تجميع البيانات
  - \* الدرس الثاني : تنظيم و عرض البيانات
  - \* الدرس الثالث : قراءة الجداول و الرسوم البيانية
  - \* الدرس الرابع : تمثيل البيانات  
بالمضلع التكراري
  - \* الدرس الخامس : تمثيل البيانات  
بالقطاعات الدائرية

يُتَعَلَّمُ  
لِلْأَمَانَةِ  
الْعُلْمِيَّةِ  
وَالْمُهَاجِرَةِ  
إِلَى الْأَنْجَادِ  
يُؤْمِنُ  
بِالْمُؤْمِنِ  
يُتَفَقَّهُ  
فِي الْمُفْقَهِ  
يُتَسْعَى  
لِلْمُتَسْعَى



ملاحظات :

(١) الشكل المقابل يمثل شكل فن

للمجموعتين  $U$  ،  $T$ 

(٢)  $T = U \cap \{ \cdot \}$

(٣)  $U \supset T$

(٤)  $T \cap U = T$

(٥)  $T \cup U = U$

(٦)  $\emptyset = T - U = \{ \cdot \}$

(٧)  $U - T = \{ \cdot \}$

(٨) أكمل بوضع الرمز المناسب  $\exists$  ،  $\supset$  ،  $\cap$  ،  $\cup$  :

(٩)  $\{ \cdot , \cdot , \cdot \} \supset \{ \cdot , \cdot \}$  .....  $T$

(١٠)  $\{ \cdot \} \cup \{ \cdot \} \supset \{ \cdot \}$  .....  $T$

(١١)  $\{ \cdot \} \cap \{ \cdot \} \supset \{ \cdot \}$  .....  $T$

(١٢)  $\{ \cdot \} \cup \{ \cdot \} \supset \{ \cdot \}$  .....  $T$

(١٣)  $\{ \cdot , \cdot , \cdot , \cdot \} \supset \{ \cdot , \cdot , \cdot \}$  .....  $T$

(١٤)  $\{ \cdot , \cdot , \cdot , \cdot , \cdot \} \supset \{ \cdot , \cdot , \cdot \}$  .....  $T$

(١٥) أكمل ما يلى :

(١) أصغر عدد طبيعي هو ....

(٢) أصغر عدد في مجموعة أعداد العد هو ....


(٣) مجموعة الأعداد الطبيعية الأقل من ٦ هي ....

(٤) المليار ....  $U$ (٥)  $U = \{ \cdot , \cdot \}$  ....

## الوحدة الأولى

## الدرس الأول : مجموعة الأعداد الطبيعية

تمهيد :



لعد عربات القطار بالشكل المقابل ( ماعدا القاطرة ) من الطبيعي سنبدأ بالعدد ١ ثم ٢ ثم ٣ و هكذا

فإذا كان آخر عدد هو ٤ ، فإننا نقول :

إن عدد عربات القطار  $\leq$  عربات

هذه الأعداد ابتداء من العدد ١ تسمى : مجموعة أعداد العد

و يرمز لها بالرمز  $U$  حيث :

$$U = \{ 1, 2, 3, 4, \dots \}$$

و هي مجموعة غير منتهية


و إذا أضفنا العنصر ( صفر ) إلى عناصر مجموعة أعداد العد فإننا

نحصل على مجموعة جديدة تسمى : مجموعة الأعداد الطبيعية

و يرمز لها بالرمز  $T$  حيث :

$$T = \{ 1, 2, 3, 4, \dots \}$$

و هي مجموعة غير منتهية



ملاحظات :

(١) من شكل فن المقابل نستنتج :

[١]  $F \subset T, Z \subset T$


[٢]  $Z \cap F = T, Z \cap F = \emptyset$

[٣]  $F \cap T = F, Z \cap T = Z$

[٤]  $T - Z = F, T - F = Z$

[٥]  $F - Z = F, Z - F = Z$


[٦]  $F - T = \emptyset, Z - T = \emptyset$



(٢) من شكل فن المقابل نستنتج :

[١]  $Z \cap F = \emptyset$

[٢]  $Z \not\subset F, F \not\subset Z$



(٣) من شكل فن المقابل نستنتج :

[١]  $F - Z = \emptyset$

[٢]  $F \not\subset Z$  لأن :

[٣]  $Z \not\subset F, F \ni Z$




(٤) إذا كانت :  $T$  هي المجموعة الشاملة فإن :

[١]  $Z' = F$

[٢]  $F' = Z$

## الدرس الثاني : بعض المجموعات الجزئية من ط

نعم أن :

مجموعة الأعداد الطبيعية :  $T = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$   
و يمكن تمثيل المجموعات التالية على خط الأعداد كما يلى :مجموعة الأعداد الطبيعية ( $T$ )مجموعة الأعداد الزوجية ( $Z$ )مجموعة الأعداد الفردية ( $F$ )مجموعة الأعداد الأولية ( $P$ )

و من ذلك نجد :

مجموعة الأعداد الزوجية ( $Z$ ) =  $\{0, 2, 4, 6, 8, \dots\}$ مجموعة الأعداد الفردية ( $F$ ) =  $\{1, 3, 5, 7, 9, \dots\}$ مجموعة الأعداد الأولية ( $P$ ) =  $\{2, 3, 5, 7, 11, \dots\}$

(٣) أكتب بطريقة السرد كلاً من المجموعات التالية :

[١]  $S =$  مجموعة الأعداد الفردية الأقل من ١٥

$$\dots =$$

[٢]  $C =$  مجموعة الأعداد الزوجية الأكبر من ٨

$$\dots =$$

[٣]  $U =$  مجموعة الأعداد الأولية المحسورة بين ٢٠ ، ٣

$$\dots =$$

ثم أوجد :

$$\dots = C \cap U \quad [٤] \quad \dots = S \cap U \quad [٥]$$

$$\dots = U - S \quad [٦] \quad \dots = S - C \quad [٧]$$

(٤) أكمل ما يلى :

$$\dots = P \cap \{ ٢ \} \quad [٨]$$

$$\dots = Z \cap \{ ٠ \} \quad [٩]$$

$$\dots = \text{مجموعة عوامل العدد } ٦ \cap F \quad [١٠]$$

$$\dots = \text{مجموعة عوامل العدد } ٤ - P \quad [١١]$$

$$\dots = T - Z' \quad [١٢]$$

$$\dots = T - (Z \cap F) \quad [١٣]$$

$$\dots = T - (Z \cap F) = \dots \quad [١٤]$$

(١) أكمل ما يلى :

[١] أصغر عدد أولى هو ....

$$\dots = P \cap Z \quad [١٥]$$

[٣] جميع الأعداد الأولية أعداد فردية ماعدا .... فهو عدد زوجي

[٤] مجموعة الأعداد الفردية الأكبر من ٧ هي ....

[٥] مجموعة الأعداد الزوجية الأقل من ١٠ هي ....

[٦] مجموعة الأعداد الأولية المحسورة بين ٣ ، ٢٥ هي ....

(٢) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

[١] وزن أي شئ بالكيلوجرامات .... ط (٣ ، ٢ ، ١)

[٢] عدد صفحات الكتاب .... ط (٢ ، ٣ ، ٤)

[٣] أصغر عدد أولى هو .... (٢ ، ١ ، ٠)

[٤] إذا كان :  $S \ni T$  و كان :  $0 \in \{ ٤ ، ٦ ، ٢ \}$  فإن :  $S = \dots$

[٥] إذا كان :  $S$  ،  $C \ni T$  و كان :  $\{ ٥ ، ٣ ، ١ \} = \{ S , C \}$  فإن :  $S + C = \dots$

[٦] إذا كان :  $S$  ،  $C \ni T$  و كان :  $\{ ٢ ، ٨ ، ١٠ \} = \dots$

[٧] إذا كان :  $S$  ،  $C \ni T$  و كان :  $\{ ٣ ، ٣ ، ٣ \} = \{ S , C \}$  فإن :  $S + C = \dots$

[٨] إذا كان :  $S$  ،  $C \ni T$  و كان :  $\{ ٣ ، ٣ ، ٣ \} = \{ S , C \}$  فإن :  $S + C = \dots$

مثال : مثل على خط الأعداد كلاً من المجموعات التالية :

$S =$  مجموعة الأعداد الطبيعية الأقل من ٦




$C =$  مجموعة الأعداد الزوجية

ثم أوجد :  $S \cap C$  ،  $S \cup C$  ،  $S - C$

الحل

$$S = \{1, 2, 3, 4, 0\},$$


$$C = \{\dots, 8, 6, 4, 2, 0\}$$



$$S \cap C = \{0, 1, 2, 3, 4\}$$



$$S \cup C = \{\dots, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0\}$$




$$S - C = \{0, 1, 3, 5\}$$


### الدرس الثالث : ترتيب و مقارنة الأعداد الطبيعية

أولاً : تمثيل الأعداد الطبيعية ( ط ) على خط الأعداد :


(١) نرسم خطًا مستقيماً



(٢) نحدد النقطتين M ، B على هذا الخط




(٣) نحدد النقطة H على الخط بحيث : M < B < H




(٤) نحدد النقاط E ، H ، و ، ... بحيث :

$$M < B < H < E < W < \dots$$



(٥) نضع الأعداد : 0, 1, 2, 3, 4, ...

لتناظر النقاط : M ، B ، H ، E ، W ، ...



ملاحظة :

العدد الطبيعي ٣ يقع على يمين العدد ٢ مباشرة ،

و يقع على يسار العدد ٤ مباشرة

**ثانياً : ترتيب و مقارنة الأعداد الطبيعية :**  
النقط على خط الأعداد التالي :



تمثل مجموعة الأعداد الطبيعية و من ذلك نستنتج :

- (١) العدد ٢ يقع مباشرة على يمين العدد ١ و لذلك :  $2 > 1$
- (٢) العدد ١ يقع مباشرة على يسار العدد ٢ و لذلك :  $1 < 2$
- (٣) العدد ٦ يقع مباشرة على يمين العدد ٥ و لذلك :  $6 > 5$
- (٤) العدد ٥ يقع مباشرة على يسار العدد ٦ و لذلك :  $5 < 6$

**و بصفة عامة :**

إذا كان :  $a, b$  عددين طبيعين  
ممثلين على خط الأعداد كما بالشكل المقابل :

- (١) النقطة التي تمثل العدد  $b$  تقع على يمين النقطة التي تمثل العدد  $a$  فإن :  $b > a$
- (٢) النقطة التي تمثل العدد  $a$  تقع على يسار النقطة التي تمثل العدد  $b$  فإن :  $a > b$

(٣) إذا كانت :  $a, b, c, d, e, f$  أعداد طبيعية ممثلة على خط الأعداد المقابل

أكمل مستخدماً ( $<$  أو  $>$ ) :

[١]  $c \dots a$  لأن :  $c$  تقع على ....  $a$

[٢]  $e \dots c$  لأن :  $e$  تقع على ....  $c$

**(٤) مثل على خط الأعداد المجموعات التالية :**

$$\{1, 2, 3, 4\} = S$$



$\{1, 2, 3, 4\}$  = مجموعة الأعداد الفردية



$\{1, 2, 3, 4\}$  = مجموعة الأعداد الأولية



**(٥) مثل على خط الأعداد المجموعات التالية :**

$$\{1, 2, 3, 4, 0, 0, 0\} = S$$

ثم أوجد :  $S \cap C$  ;  $S \cup C$   
 $, S - C$  ;  $C - S$



$$S \cap C = \dots$$

$$S \cup C = \dots$$

$$S - C = \dots$$

$$C - S = \dots$$

$$\text{ص} = \{s : s \in \mathbb{N}, s \leq 3\} \quad [٣]$$

$$\text{ع} = \{s : s \in \mathbb{N}, 1 < s \geq 6\} \quad [٤]$$

$$\text{ل} = \{s : s \in \mathbb{N}, 2 \geq s \geq 7\} \quad [٥]$$

(٥) ضع الرمز المناسب من الرموز ( $<$ ،  $>$ ،  $=$ ) مكان النقطة :

$$7..8 \dots 7.8 \quad [١]$$

$$1107 \dots 1170 \quad [٢]$$

$$s \dots 8 + s \dots 7, s \in \mathbb{N} \quad [٣]$$

$$s \dots 70, s \in \{30, 40, 50\} \quad [٤]$$

$$s - 8 \dots s - 7, s \in \mathbb{N} \quad [٥]$$

$$s \dots 17, s \in \{17\} \quad [٦]$$

(٦) إذا كان : ص ، س ، ع ، ل أربعة أعداد طبيعية و كان :  
 $l < s$  ،  $s > u$  ،  $u > l$  ،  $s > l$  ،  
 ص  $>$  س رتب هذه الأعداد تصاعدياً  
 و مثتها على خط الأعداد

الترتيب : ....

$$b \dots e \text{ لأن : } b \text{ تقع على .... e} \quad [٣]$$

$$e \dots h \text{ لأن : } e \text{ تقع على .... h} \quad [٤]$$

(٧) الترتيب التصاعدي لهذه الأعداد هو : ....

**ملاحظة :**

نعبر رمياً عن المجموعات التالية كما يلى :

(١) مجموعة الأعداد الطبيعية الأكبر من ٧ =

$$\{s : s \in \mathbb{N}, s < 7\}$$

(٢) مجموعة الأعداد الطبيعية الأقل من ٨ =

$$\{s : s \in \mathbb{N}, s > 8\}$$

(٣) مجموعة الأعداد الطبيعية الأقل من أو تساوى ٥ =

$$\{s : s \in \mathbb{N}, s \geq 0\}$$

(٤) مجموعة الأعداد الطبيعية الأكبر من أو تساوى ٤ =

$$\{s : s \in \mathbb{N}, s \leq 4\}$$

(٥) مجموعة الأعداد الطبيعية الأكبر من ٤ و أقل من ٧ =

$$\{s : s \in \mathbb{N}, 4 < s > 7\}$$

(٦) أكتب بطريقة السرد ومثل على خط الأعداد كلاً مما يلى :

$$\text{ص} = \{s : s \in \mathbb{N}, s > 6\} \quad [١]$$

(٨) عبر عن الجمل التالية مستخدماً الرموز ( $<$  ،  $>$  ،  $\leq$  ،  $\geq$ ) :

[١] س أقل من ٥

.....

[٢] ع أكبر من أو تساوى ٣

.....

[٣] ص أكبر من ٣ و أقل من أو تساوى ٨

.....

[٤] ل أكبر من أو تساوى ٤ و أقل من أو تساوى ٩

.....

(٩) عبر عن الجمل التالية لفظياً :

[١] س  $\leq$  ٣

.....

[٢] ع  $>$  ٦

.....

[٣] ص  $\geq$  ٨

.....

[٤] ل  $>$  ٩

.....

(٩) أكمل ما يلى :

[١] إذا كانت : س = {س : س  $\in$  ط ، س  $>$  ٣}

فإن : س = ....

[٢] إذا كانت : ص = {س : س  $\in$  ط ، ١  $\geq$  س  $>$  ٥}

فإن : ص = ....

[٣] إذا كانت : ع = {س : س  $\in$  ط ، ٣  $>$  س  $>$  ٨}

فإن : ع = ....

[٤] إذا كانت : ل = {س : س  $\in$  ط ، ٢  $\geq$  س  $\geq$  ٦}

فإن : ل = ....

[٥] إذا كانت : م = {س : س  $\in$  ط ، س  $\leq$  ٤}

فإن : م = ....

[٦] العدد : ٦ يقع يمين العدد : .... مباشرة

[٧] العدد : ٦ يقع يسار العدد : .... مباشرة

[٨] العدد : ٧ يقع يمين العدد : .... مباشرة

[٩] العدد : ٧ يقع يسار العدد : .... مباشرة

ملاحظات :

$$(1) \text{ لأى عددين طبيعيين } a, b \text{ يكون: } a + b = b + a, \quad a, b \in \mathbb{N}$$

أى أن : عملية الجمع مغلقة في  $\mathbb{N}$  " خاصية الإغلاق "

فمثلاً :  $7 = 3 + 4, \quad 7 \in \mathbb{N} \quad \exists 7 \in \mathbb{N}$

$$(2) \text{ لأى ثلاثة أعداد طبيعية } a, b, c \text{ يكون:}$$

$$(a + b) + c = a + (b + c) = a + b + c$$

$$\text{فمثلاً: } (3+4)+5 = 0+(3+4) = 0+5 = 12 = 0+3+4 = 0+4+3 = 12$$

" خاصية الدمج ( التجميع ) "

$$(3) \text{ لأى عدد طبيعي } n \text{ يكون: } n + . = . + n$$

$$\text{فمثلاً: } 4 + . = . + 4 = 4$$

$$\text{أى أن: } 4 + . = . + 4 = 4 \quad \text{و يقال أن:}$$

الصفر عنصر محايد جمعي في  $\mathbb{N}$  " خاصية الغنر المحايد "

(٤) يمكن استخدام خاصيّتى الإبدال و الدمج في تسهيل إيجاد ناتج

جمع الأعداد الطبيعية كما يلى :

$$(1) 51 + 49 + 348 = 49 + 51 + 348 = (49 + 51) + 348 \quad \text{خاصية الدمج}$$

$$= (48 + 50) + 348 \quad \text{خاصية الإبدال}$$

$$= 348 + (49 + 50) \quad \text{خاصية الدمج}$$

$$= 348 + 100 = 448$$

$$(2) 64 + 70 + 36 + 50 = 64 + (70 + 36) + 50 \quad \text{الدمج}$$

$$= 64 + (70 + 50) + 36 \quad \text{الإبدال}$$

$$= 64 + (120 + 36) \quad \text{الإبدال}$$

$$= 160 + 36 = 196$$


## الدرس الرابع : العمليات على الأعداد الطبيعية

أولاً : عملية الجمع في  $\mathbb{N}$ 

لا يوجد ناتج :  $3 + 4$  نستخدم خط الأعداد كما يلى :

نبدأ من النقطة (و) التي تمثل العدد ( صفر ) ثم نتحرك ٣ وحدات جهة اليمين ، ثم ٤ وحدات في نفس الاتجاه فنصل إلى العدد ٧


أى أن :  $7 = 3 + 4$



و بطريقة أخرى :

نبدأ من النقطة (و) التي تمثل العدد ( صفر ) ثم نتحرك ٤ وحدات جهة اليمين ، ثم ٧ وحدات في نفس الاتجاه فنصل إلى العدد ٧

أى أن :  $7 = 4 + 3$

أى أن :  $7 = 4 + 3 = 3 + 4$ 

و بصفة عامة :


إذا كان :  $a, b$  عددين طبيعين فإن :

$$a + b = b + a$$

أى أن :

عملية الجمع إبدالية في  $\mathbb{N}$ 

" خاصية الإبدال "




## ثانياً : عملية الطرح في ط

(١) لإيجاد ناتج :  $7 - 4$  نستخدم خط الأعداد كما يلى :

نبداً من النقطة (و) التي تمثل العدد (صفر) ثم نتحرك ٧ وحدات جهة اليمين ، ثم ٤ وحدات جهة اليسار فنصل إلى العدد ٣

أى أن :  $7 - 4 = 3$



(٢) لإيجاد ناتج :  $4 - 7$  نستخدم خط الأعداد كما يلى :

نبداً من النقطة (و) التي تمثل العدد (صفر) ثم نتحرك ٤ وحدات جهة اليمين ، ثم ٧ وحدات جهة اليسار نجد أن عملية الطرح غير ممكنة في ط

أى أن :  $4 - 7$  غير ممكنة في ط



## ملاحظات :

- (١) عملية الطرح ليست ممكنة دائمًا في ط
  - (٢) لأى عددين طبيعيين  $\mathbb{M}$  ،  $\mathbb{B}$  يكون :
- $\mathbb{M} - \mathbb{B}$  ممكنة في ط عندما :  $\mathbb{M} \leq \mathbb{B}$
- أى : إذا كان المطروح منه أكبر من أو يساوى المطروح

(٣) وضع الرمز المناسب من الرموز (  $\exists$  ،  $\nexists$  ) مكان النقطة :

$$\text{[١]} (\mathbb{V} + \frac{1}{2}) \dots \text{ط}$$

$$\text{[٢]} (\mathbb{V} + 3,0) \dots \text{ط}$$

$$\text{[٣]} (\mathbb{V},0 + \mathbb{V},0) \dots \text{ط}$$

(٤)  $\mathbb{P} , \mathbb{B} , \mathbb{H} \exists \text{ ط} \quad \text{أكمل ما يلى} :$

$$\text{خاصية ....} \quad \mathbb{P} + \mathbb{B} = \mathbb{B} + \mathbb{P} \quad \text{[١]}$$

$$\text{خاصية ....} \quad \mathbb{P} + \mathbb{B} = \mathbb{B} + \mathbb{P} \quad \text{[٢]}$$

$$\text{....} = \mathbb{H} + \text{....} + (\mathbb{B} + \mathbb{P}) = \mathbb{H} + \mathbb{B} + \mathbb{P} \quad \text{[٣]}$$

خاصية ....

(٥) أكمل لإيجاد الناتج مع كتابة الخاصية المستخدمة :

$$\text{[١]} 4\mathbb{G} + 7\mathbb{L} + 0\mathbb{A} = 0\mathbb{A} + 4\mathbb{G} + \text{....}$$

$$\text{[٢]} \text{....} + \text{....} + 4\mathbb{G} =$$

$$\text{[٣]} \text{....} + (\text{....} + 4\mathbb{G}) =$$

$$\text{....} = \text{....} + \text{....} =$$

$$\text{[٤]} 6\mathbb{L} + 6\mathbb{A} + 6\mathbb{G} = 6\mathbb{G} + 6\mathbb{A} + 6\mathbb{L} \quad \text{خاصية ....}$$


$$\text{[٥]} 6\mathbb{L} + 6\mathbb{A} + 3\mathbb{G} =$$

$$\text{[٦]} (\text{....} + \text{....}) + (\text{....} + \text{....}) =$$

$$\text{....} = \text{....} + \text{....} =$$


**ثالثاً : عملية الضرب في ط**

(١) لايجد ناتج :  $2 \times 3$  نستخدم خط الأعداد كما يلى :  
نبدأ من النقطة (و) التي تمثل العدد (صفر) ثم نتحرك ٣ مسافات متساوية جهة اليمين وكل مسافة مكونة من وحدتين فنصل إلى العدد ٦  
أى أن :  $2 \times 3 = 6$



و

(٢) لايجد ناتج :  $3 \times 2$  نستخدم خط الأعداد كما يلى :  
نبدأ من النقطة (و) التي تمثل العدد (صفر) ثم نتحرك مسافتين متساوietين جهة اليمين كل منها مكونة من ٣ وحدات فنصل إلى العدد ٦  
أى أن :  $3 \times 2 = 6$



و

و بصفة عامة :

إذا كان :  $a, b$  عددين طبيعين فإن :

$$a \times b = b \times a$$

أى أن : عملية ضرب الأعداد الطبيعية عملية إبدالية  
"خاصية الإبدال"

(٤) ضع الرمز المناسب من الرموز (  $\exists$  ،  $\notin$  ) مكان النقطة :

[١] (٣ - ٥) .... ط

[٢] (٠ - ٥) .... ط

[٣] (٠,٥ - ٥) .... ط

[٤] (٥ - ٠,٥) .... ط

(٥) إذا كان عمر رجل الآن س سنة حيث س  $\in \mathbb{N}$  أكمل ما يلى :

[١] عمر الرجل بعد ٦ سنوات = .... سنة

[٢] عمر الرجل منذ ٦ سنوات = .... سنة

(٦) أكمل ما يلى ثم ذكر ماذا تستنتج :

.... = ٦ - ٢ = .... ،  $2 - 6 = \dots$  [١]

الاستنتاج :

$13 - 8 = \dots = 8 - 13$  [٢]

.... =  $0 - \dots = \dots - 0$  [٣]

الاستنتاج :



# تفوقك في أي عمل عليه العالمة زي

و تسمى هذه الخاصية توزيع الضرب على الجمع في ط

$$\text{فمثلاً : } 4 \times (3 + 0) = 8 \times 4 = 32$$

$$32 = 12 + 20 = 4 \times 3 + 4 \times 0$$

$$\text{أى أن : } 4 \times (3 + 0) = 3 \times 4 + 0 \times 4$$

(٧) يمكن استخدام توزيع الضرب على الجمع في تسهيل ايجاد ناتج ضرب الأعداد الطبيعية كما يلى :

$$[1] \quad 39 \times 99 = 99 \times (100 - 1)$$

$$\text{خاصية التوزيع} \quad 1 \times 39 - 100 \times 39 =$$

$$3861 = 39 - 3900 =$$

$$[2] \quad (2 + 100) \times 39 = 102 \times 39$$

$$\text{خاصية التوزيع} \quad 2 \times 39 + 100 \times 39 =$$

$$3978 = 78 + 3900 =$$

(٨) ضع الرمز المناسب من الرموز (  $\exists$  ،  $\nexists$  ) مكان النقطة :

$$[1] \quad (2 \times 0) \dots \text{ط}$$

$$[2] \quad (2 \times 3,0) \dots \text{ط}$$

(٩)  $\exists$  ،  $\nexists$  ،  $\exists \nexists$  أكمل ما يلى :

$$\text{خاصية ....} \quad .... \times \exists = .... \times \nexists [1]$$

$$\text{خاصية ....} \quad .... = \exists \times .... = .... \times \nexists [2]$$

$$[3] \quad (\exists + \nexists) \times .... = .... \times \exists + .... \times \nexists \quad \text{خاصية ....}$$

## ملاحظات :

(١) لأى عددين طبيعيين  $\mathfrak{m}$  ،  $\mathfrak{n}$  يكون :  $\mathfrak{m} \times \mathfrak{n} = \mathfrak{n} \times \mathfrak{m} \in \text{ط}$

أى أن : عملية الضرب مغلقة في ط " خاصية الانغلاق "

$$\text{فمثلاً : } 3 \times 12 = 12 \times 3 \in \text{ط}$$

(٢) لأى ثلاثة أعداد طبيعية  $\mathfrak{m}$  ،  $\mathfrak{n}$  ،  $\mathfrak{p}$  يكون :

$$(\mathfrak{m} \times \mathfrak{n}) \times \mathfrak{p} = \mathfrak{m} \times (\mathfrak{n} \times \mathfrak{p}) = \mathfrak{m} \times \mathfrak{n} \times \mathfrak{p}$$

$$\text{فمثلاً : } 6 = 3 \times (0 \times 4) = 3 \times (3 \times 0) = (3 \times 3) \times 0 = 9 \times 0 = 0$$

" خاصية الدمج ( التجميع ) "

(٣) لأى عدد طبيعي  $\mathfrak{m}$  يكون :  $\mathfrak{m} \times 1 = 1 \times \mathfrak{m} = \mathfrak{m}$

$$\text{فمثلاً : } 4 \times 1 = 4 \quad , \quad 1 \times 4 = 4$$

أى أن :  $1 \times 4 = 4 = 4$  و يقال أن :

١ العنصر المحايد الضريبي في ط " خاصية العنصر المحايد "

(٤) لأى عدد طبيعي  $\mathfrak{m}$  يكون :  $\mathfrak{m} \times . = . = \mathfrak{m}$

(٥) يمكن استخدام خاصيّتى الإبدال و الدمج في تسهيل ايجاد ناتج ضرب الأعداد الطبيعية كما يلى :

$$4 \times 39 = 20 \times 39 = 20 \times (20 + 19) \quad \text{خاصية الدمج}$$

$$(39 \times 20) \times 4 = 39 \times (20 \times 4) \quad \text{خاصية الإبدال}$$

$$39 \times (20 \times 4) = 39 \times 80 =$$

$$3900 = 39 \times 100 =$$

(٦) لأى ثلاثة أعداد طبيعية  $\mathfrak{m}$  ،  $\mathfrak{n}$  ،  $\mathfrak{p}$  يكون :

$$\mathfrak{m} \times (\mathfrak{n} + \mathfrak{p}) = \mathfrak{m} \times \mathfrak{n} + \mathfrak{m} \times \mathfrak{p}$$

$$(\mathfrak{m} + \mathfrak{n}) \times \mathfrak{p} = \mathfrak{m} \times \mathfrak{p} + \mathfrak{n} \times \mathfrak{p}$$

رابعاً : عملية القسمة في ط

$$\text{نعم أن} : 3 \div 10 = 0.3 \in \text{ط}$$

$$\text{بينما} : 7,0 = 4 \div 3.0 \in \text{ط} \neq 0.7$$

أى أن : عملية القسمة في ط ليست دائماً ممكنة في ط

ملاحظات :

$$(١) \frac{3}{0} \text{ و تكتب أيضاً } (0 \div 3) \in \text{ط لأن} : 0 \times 3 = 0.$$

$$(٢) \frac{3}{0} \text{ و تكتب أيضاً } (3 \div 0) \text{ غير ممكنة}$$

حيث لا يوجد عدد إذا ضرب في الصفر يكون الناتج 3  
قسمة أى عدد طبيعي على العدد صفر غير ممكنة

(٤) أكمل ما يلى ثم ذكر ماذا تستنتج :

$$\dots = 6 \div 2 = 3 \quad , \quad \dots = \dots$$

الاستنتاج :

$$' \quad \dots = \dots \div 24 = (2 \div 4) \div 24 \quad [٣]$$

$$\dots = 2 \div \dots = 2 \div (4 \div 24)$$

الاستنتاج :

(٩) أكمل لإيجاد الناتج مع كتابة الخاصية المستخدمة :

$$\dots \text{ خاصية } .... \quad (120 \times \dots) \times 8 = 120 \times 76 \times 8 \quad [١]$$

$$\dots \text{ خاصية } .... \quad (\dots \times \dots) \times 8 =$$

$$\dots \text{ خاصية } .... \quad \dots \times (\dots \times 8) =$$

$$\dots = \dots \times \dots =$$

$$60 \times (\dots - \dots) = 60 \times 98 \quad [٢]$$

$$\dots \text{ خاصية } .... \quad 60 \times \dots - 60 \times \dots =$$

$$\dots = \dots - \dots =$$

$$50 \times (\dots + \dots) = 50 \times 34 \quad [٣]$$

$$\dots \text{ خاصية } .... \quad 50 \times \dots - 50 \times \dots =$$

$$\dots = \dots + \dots =$$

$$\dots \text{ خاصية } .... \quad (\dots + \dots) \times 17 = 64 \times 17 + 17 \quad [٤]$$

$$\dots = \dots \times 17 =$$

[١١] العنصر المحايد الضريبي في ط .... العنصر المحايد الجمعي في ط  
( $>$  ،  $=$  ،  $<$ )

[١٢] خمسة أعداد طبيعية أكبرها س + ٤  
أوجد الأعداد الأربع الأخرى  
الأعداد هي : ....

[١٣] إذا كان : س عدداً زوجياً ينحصر بين ٥ ، ٩

أوجد قيم كل من س ،  $\frac{1}{2}$  س  
قيم س هي : .... ، قيم  $\frac{1}{2}$  س هي : ....

[١٤] استخدم خواص الإبدال و الدمج و التوزيع لإيجاد ما يلى :

$$149 + 101 + 327 + [١]$$

$$228 + 8.4 + 772 + 196 [٢]$$

$$4 \times 89 \times 25 [٣]$$

$$98 \times 10 [٤]$$

$$100 \times 0.7 [٥]$$

[١٥] رتب نواتج العمليات التالية تصاعدياً :  
 $0 \times (3 \times 7) - 178 - 178 - 30$  ،  $10 \times 7$

[١٦] أختـر الإجابة الصـحـيـحةـ منـ بـيـنـ الإـجـابـاتـ المـعـطـاـةـ :

[١] عدد فردى + عدد فردى = عدد ....

(فردى ، زوجى ، أولى)

[٢] عدد فردى + عدد زوجى = عدد ....

(فردى ، زوجى ، أولى)

[٣] عدد زوجى × عدد زوجى = عدد ....

(فردى ، زوجى ، أولى)

[٤] أصغر عدد أولى × أي عدد = عدد ....

(فردى ، زوجى ، أولى)

[٥] إذا كان : س عدداً فردياً فإن  $(س - 1)$  يكون عدداً ....

(فردياً ، زوجياً ، أولياً)

[٦] إذا كان : س عدداً فردياً فإن  $(س + 2)$  يكون عدداً ....

(فردياً ، زوجياً ، أولياً)

[٧] إذا كان : س عدداً فردياً فإن  $(س + 1)$  يكون عدداً ....

(فردياً ، زوجياً ، أولياً)

[٨] إذا كان :  $17 \times 36 = 36 \times س$  فإن س = ....

(٣٦ ، ١٩ ، ١٧)

[٩] إذا كان :  $70 = 70 + 0 = 10 \times س$  فإن س = ....

(٧ ، ٠٠ ، ٧٠)

[١٠] إذا كان :  $7 \times 40 = (س \times 0) + (س \times 40)$

فإن س = ....

(٧ ، ٥ ، ٤)

(٣) ٦٤ ، ٦٠ ، ٥٦ ، ..... ،

نلاحظ أن : بدأنا بالعد ٦٤ ، كل عدد يقل عن سابقه بمقدار ٤ أى : يجب طرح ٤ إلى كل عدد لنحصل على العدد التالي فيكون العددان الذين يكملان النمط هما : ٤٨ ، ٤٤

(٤) ٥١٢ ، ٢٥٦ ، ١٢٨ ، ٦٤ ، ..... ،

نلاحظ أن : بدأنا بالعد ٥١٢ و بالقسمة  $\div 2$  نحصل على العدد التالي فيكون العددان الذين يكملان النمط هما : ٣٢ ، ١٦

(١) أكمل كلاً من الأنماط التالية بعديدين تاليين في كل نمط :

.... ، ٣ ، ٨ ، ١٣ ، ١٨ ، .... ، ،

.... ، ١ ، ٢ ، ٤ ، ٨ ، .... ، ،

.... ، ٩٠ ، ٨٠ ، ٧٠ ، ٦٠ ، .... ، ،

.... ، ٦٤ ، ٣٢ ، ١٦ ، ٨ ، .... ، ،

.... ، ٣ ، ٣٣ ، ٣٣٣ ، ٣٣٣٣ ، .... ، ،

.... ، ١ ، ٢ ، ٤ ، ٧ ، .... ، ،

.... ، ١ × ١ ، ١ × ٢ ، ٢ × ٣ ، ٣ × ٤ ، ٤ × ٥ ، .... ، ،

## الدرس الخامس : الأنماط العددية

**النمط** : هو تتابع من أعداد أو رموز أو أشكال وفقاً لنظام معين (أو لقاعدة معينة) يمكن التنبؤ به (بها)

**النمط العددي** : هو تتابع من الأعداد وفق نظام معين يمكن التنبؤ به

### استخدامات الأنماط العددية :

تستخدم الأنماط العددية لوصف أشياء حقيقة مثل : التزايد السكاني ، تحلل المواد المشعة ، الابتكارات الفنية

### تكوين النمط العددي :

لتكون النمط العددي نوجد العدد الذي يتم إضافته أو طرحه أو ضربه أو قسمته

### ويوضح ذلك من خلال إكمال الأنماط التالية :

(١) ٥ ، ١٠ ، ٢٠ ، ..... ،


نلاحظ أن : بدأنا بالعد ٥ ، كل عدد يزيد عن سابقه بمقدار ٥ أى : يجب إضافة ٥ إلى كل عدد لنحصل على العدد التالي فيكون العددان الذين يكملان النمط هما : ٣٠ ، ٢٥

(٢) ١ ، ٣ ، ٩ ، ٢٧ ، ..... ،


نلاحظ أن : بدأنا بالعد ١

و بالضرب  $\times 3$  نحصل على العدد التالي فيكون العددان الذين يكملان النمط هما : ٨١ ، ٢٤٣

- (٥) أوجد عدد الدوائر في كل شكل للنمط التالي ثم إرسم عدد الدوائر بالشكل الخامس و أوجد عددها :



(٥)



(٣)



(٢)




(١)


الشكل :

	٠	٤	٣	٢	١	الشكل
عدد الدوائر	...	...	...	٣	١	

- (٦) أوجد عدد المربعات في كل شكل للنمط التالي ثم إرسم عدد المربعات بالشكل الخامس و أوجد عددها :



(٥)



(٣)



(٢)



(١)

الشكل :

	٠	٤	٣	٢	١	الشكل
عدد المربعات	...	...	...	٤	١	

- (٧) دفعت هناء ٣٥ جنيهاً قيمة اشتراكاتها السنوية في إحدى نوادي العلوم ، فإذا كانت قيمة الاشتراك تزيد بمبلغ ١٠ جنيهات كل عام عن العام الذي يسبقه ، فكم ستكون قيمة الاشتراك في هذا النادى بعد ١٠ سنوات ؟  
أكمل الجدول :

الأعوام	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	٠	قيمة الاشتراك
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	٣٥

- (٨) باع هانى بطاقة تعطى تخفيضات فى بعض محلات الوجبات السريعة بمبلغ ٨٥ جنيهاً ، فإذا كان ثمن البطاقة قد زاد بمعدل ٥ جنيهات سنويًا خلال فترة حيازته لها وهى ٥ سنوات فما الثمن الذى اشتري به هانى هذه البطاقة ؟  
أكمل الجدول :

الأعوام	٥	٤	٣	٢	١	٠	ثمن البطاقة
...	...	...	...	٨٠	٨٥	٨٥	٨٥

- (٩) لدى مزارع زوج من الأرانب يتکاثر كل فترة بتضاعف عددها فكم يصبح عددها بعد ٥ فترات ؟  
أكمل الجدول :

الفترات	٥	٤	٣	٢	١	٠	عدد الأرانب
...	...	...	...	٤	٢	٢	٢

، عناصر القطر الثالث هى : (١ ، ٣ ، ٦ ، .... ، .... )

(٨) نعم أن :  $1 = 1 \times 1$

$$121 = 11 \times 11$$

$$12321 = 111 \times 111$$

$$\dots = 1111 \times 1111$$

$$\dots = 11111 \times 11111$$

وأوجد قيمة :

$$\dots = 11111111 \times 11111111$$

			١			
		٤	٣	٢		
٩	٨	٧	٦	٥		
١٦	١٥	١٤	١٣	١٢	١١	١٠

(٩) لاحظ الشكل المقابل :


و فيه تم ترتيب أعداد العد في صفوف وأعمدة و تم تكوين الأربع صفوف الأولى ، أكمل :

[١] عناصر الصف الخامس هي : ....

[٢] عناصر نهاية كل صف هي : ....

[٣] العدد في نهاية الصف العاشر هو : ....

[٤] رقم الصف الذي في نهاية العدد ١٤٤ هو : ....



فهو ناتج جمع العددين الذين فوقه (١) ، (١) ( لاحظ الأسماء )  
وفي الصف الثاني (١) ، (١) " البداية و النهاية "

أما العدد (٣) فهو ناتج جمع العددين الذين فوقه (١) ، (٢) ( لاحظ الأسماء ) ، ..... و هكذا  
أكمل ما يلى :

[١] عناصر الصف السادس هي : ....

[٢] عناصر الصف السابع هي : ....

[٣] مجموع الأعداد بكل صف هو : ....

[٤] عناصر القطر الأول هي : (١ ، ١ ، ١ ، .... ، .... )

، عناصر القطر الثاني هي : (١ ، ٢ ، ٣ ، .... ، .... )

**ملاحظة :**  
 $2 \times u$  ( و تكتب :  $2u$  ) و لفظياً تعنى : ضعف العدد  $u$   
 و كذلك :

$3 \times s$  ( و تكتب :  $3s$  )

و لفظياً تعنى : ثلاثة أمثال العدد  $s$  ،

$4 \times c$  ( و تكتب :  $4c$  )

و لفظياً تعنى : أربعة أمثال العدد  $c$  ، ..... و هكذا

(١) أكمل الجدول التالي :

مقسوماً على ٥	مضروباً × ٠	مطروحًا منه ٠	مضافاً إليه ٠	العدد	مثال
$\frac{s}{5}$	٠	$s - 0$	$s + 0$	$s$	$10$
				$s$	$[1]$
				$u$	$[2]$
				$l$	$[3]$
				$2$	$[4]$
				$7$	$[5]$

## المعادلات

### الدرس الأول : التعبيرات الرياضية

#### العبارات العددية :

كل من التعبيرات التالية تسمى عبارات عددية ( عبارات عددية )

$$36 = 9 \times 9 , 13 = 4 + 9$$

$$10 = 4 \div 40 , 0 = 4 - 9$$

#### العبارات الرمزية :

كل من التعبيرات التالية تسمى عبارات رمزية ( عبارات رمزية )

$$s + 3 = 7 , l - 1 = 4$$

$$2 \times u = 10 \quad ( \text{و تكتب} : 2u = 10 ) , \frac{v}{3} = 10$$

و يمكن التعبير عن العبارات الرمزية السابقة بعبارات لفظية

كما بالجدول التالي :

الرمز	التعبير الرمزي	التعبير اللفظي
$s + 3 = 7$	$s$	ما العدد الذي إذا أضيف إلى $s$ كان الناتج $7$
$s - 1 = 4$	$s$	ما العدد الذي إذا طرح منه $1$ كان الناتج $4$
$l \div 4 = 10$	$l$	ما العدد الذي إذا قسم على $4$ كان الناتج $10$
$2 \times u = 10$	$u$	ما العدد الذي إذا ضرب في $2$ كان الناتج $10$
$10 = v \div 3$	$v$	ما العدد الذي ضعفه يساوى $10$
$\frac{v}{3} = 10$	$v$	ما قيمة $v$ التي تجعل الكسر $\frac{v}{3}$ مكافئًا $\frac{10}{2}$

(٤) أختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

[١] ضعف العدد س مطروحاً منه ٢ = ....

(٢س - ٣ ، س - ٣ ، ٣س )

[٢] عدداً الفرق بينهما ٥ ، فإذا كان أصغر هذين العددين ص ، فإن العدد الأكبر هو ....

(٥ - س ، س + ٥ ، س - ٥ )

[٣] مستطيل عرضه س سم و طوله يزيد عن ضعف عرضه بمقدار ٣ سم فإن طول المستطيل = .... سم

(٣س - ٣ ، ٣س + ٣ ، ٣س + ٣ )

[٤] مستطيل طوله س سم و محیطه ٢٠ سم فإن عرضه = ....

(١٠ - س سم ، س - ١٠ سم ، س + ١٠ سم )

[٥] إذا كان : طولاً متباينين في ضلعين متوازي أضلاع هما س ، ص فإن : محیطه = ....

(٢س ص ، س + ص ، ٢س + ٢ص )

[٦] محیط مثلث متساوی الأضلاع طول ضلعه ل = ....

(ل - ٣ ، ٣ل ، ل + ٣ )

[٧] إذا كان مع أحمد ع من الجنيهات ، و ما مع محمد خمسة أمثل ما مع أحمد فإن ما مع محمد = .... جنيهاً

(٤٥ ، ع - ٥ ،  $\frac{1}{6}$  ع )

[٨] محیط مربع طول ضلعه ل = ....

(٤ل - ٤ ، ٤ل + ٤ ، ٤ل )

أحمد الشنتوري

(٥) أكمل الجدول التالي :

العبارة اللفظية	التعبير الرمزي
ضعف العدد س مطروحاً منه ٥	[١]
[٢]	٣ ص + ١
خمسة أمثال العدد ر مطروحاً من ٣	[٣]
[٤]	٦ + $\frac{1}{2}$ ع
ربع العدد ٤ مطروحاً منه ٤	[٥]
[٦]	العدد ٣ مقسوماً على ٣
[٧]	العدد ل مضروباً في ٧
[٨]	العدد ل مطروحاً من ٩
[٩]	٢٤ - ٤ س

(٦) أكمل ما يلى :

[١] إدخر محسن من مصروفه س جنيهًا و أعطته والدته ٧ جنيهات فيكون معه .... جنيهًا

[٢] عددان مجموعهما ٦ وأحددهما ٣ فإن الآخر يكون هو ....

[٣] عددان حاصل ضربهما ١٢ وأحددهما ٣ فيكون الآخر هو ....

[٤] مستطيل طوله يزيد عن عرضه بمقدار ٣ سم فإذا كان طوله ص سم فإن عرضه = .... سم

[٥] مساحة مستطيل طوله ع سم ، عرضه ٨ سم = .... سم

أحمد الشنتوري

**ثانياً :** يقدم أحد المطاعم وجبات عذائية سعر الوجبة الواحدة ٢٠ جنيهاً مضافاً إليها ٥ جنيهات لخدمة التوصيل للمنازل مهما كان عدد الوجبات المطلوبة وعلى ذلك يكون :

$$\text{١) ثمن وجبة واحدة بالمنزل} = ٢٠ \times ١ + ٥ = ٢٥ \text{ جنيهاً}$$

$$\text{٢) ثمن وجبتين بالمنزل} = ٢٠ \times ٢ + ٥ = ٤٥ \text{ جنيهاً}$$

$$\text{٣) ثمن ٣ وجبات بالمنزل} = ٢٠ \times ٣ + ٥ = ٦٥ \text{ جنيهاً}$$

$$\text{٤) ثمن ٤ وجبات بالمنزل} = ٢٠ \times ٤ + ٥ = ٨٥ \text{ جنيهاً}$$

، .... وهكذا

فإذا رمزنا لعدد الوجبات بالرمز  $s$  وإنما يدفع عند وصول الوجبات للمنزل بالرمز  $c$  فإن :

$$\text{العلاقة بين } s \text{ ، } c \text{ هي : } c = ٢٠s + ٥$$

لاحظ : الثمن = سعر الوجبة  $\times$  عدد الوجبات + خدمة التوصيل

**ملاحظات :**

**١)** عدد الوجبات ( رمزنا لها بالرمز  $s$  ) هي كمية متغيرة

**٢)** إنما يدفع ( رمزنا لها بالرمز  $c$  ) هو كمية متغيرة

**٣)** سعر الوجبة الواحدة هو كمية ثابتة

**٤)** مقابل خدمة التوصيل هو كمية ثابتة

**٥)** أحدد أيّاً من الكميات التالية يجب تمثيلها بمتغير و أيّها بعد ثابت :

**[١]** عدد الأيام في شهر مايو .....

**[٢]** عدد السنتيمترات في المتر .....

**[٣]** عدد سكان مدينة ما في سنوات مختلفة .....

## الدرس الثاني : المتغير و الثابت

**تمهيد :**

**أولاً :** إذا كان كتاب ٧ جنيهات وعلى ذلك يكون :

$$\text{١) ثمن كتابين} = ٢ \times ٧ = ١٤ \text{ جنيهاً}$$

$$\text{٢) ثمن ٣ كتب} = ٣ \times ٧ = ٢١ \text{ جنيهاً}$$

$$\text{٣) ثمن ٤ كتب} = ٤ \times ٧ = ٢٨ \text{ جنيهاً} , \dots \text{ وهكذا}$$

**نلاحظ أن :**

ثمن الكتاب الواحد ثابت

الثمن الكلى للكتب يتغير بتغيير عددها

إذا رمزنا لعدد الكتب بالرمز  $s$  ، وللثمن هذه الكتب بالرمز  $c$  فإن :  $c$  تتغير بتغيير  $s$  ويكون ثمن  $s$  كتاباً هو :

$$c = ٧s \quad \text{أى : } c = ٧s$$

و يمكن تكوين جدول يعبر عن قيم  $s$  و قيم  $c$  الماظرة كما يلى :

٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	٠	س
٤٩	٤٢	٣٥	٢٨	٢١	١٤	٧	ص	c

**ملاحظة :**

العلاقة :  $c = ٧s$  تربط بين المتغيرين  $s$  ،  $c$

و تسمى علاقة رياضية

(٣) أتفق صاحب مصنع مع أحد العمال على أن يكون أجره اليومى

وفقاً للعلاقة :  $ص = ١٠س + ٣٥$  حيث : س ساعات العمل

الإضافية ، ص جملة الأجر اليومى بالجنيهات أكمل :

[١] الأجر اليومى الثابت = ... جنيهاً

[٢] جملة الأجر اليومى للعامل إذا كان عدد ساعات العمل الإضافية

هو ٥ ساعات = ... جنيهاً

(٤) أشتري مدحت س كيلوجراماً من الشيكولاتة و وضعها في علبة

ثمنها ٥ جنيهات فإذا كان ثمن الكيلوجرام الواحد من الشيكولاتة

٢٨ جنيهًا أحسب ما دفعه مدحت بدلالة س

ما دفعه مدحت = .... جنيهًا

(٥) أوجد القيم العددية لكل مما يلى عندما : س = ٣ ، ٤

القيمة العددية عندما		العلاقة	
س = ٤	س = ٣		
		$س + ٧$	[١]
		$س - ٣$	[٢]
		$١٢ - س$	[٣]
		$٣س$	[٤]

(٦) أختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

[١] إذا كان طول ضلع المعين ل ، و محطيه ع فإن العلاقة الرياضية بين ع ، ل هي : ع = ...

(ل + ٤ ، ل - ٤ ، ٤ ل)

[٢] إذا كان طول ضلع المثلث المتساوی الأضلاع ل ، و محطيه ع فإن العلاقة الرياضية بين ع ، ل هي : ع = ...

(ل + ٣ ، ل - ٣ ، ٣ ل)

[٣] إذا كان عرض مستطيل س و طوله ضعف عرضه ، و محطيه ع فإن العلاقة الرياضية بين ع ، س هي : ع = ...

(٦ س ، ٤ س ، ٣ س)

[٤] عدداً س ، ص مجموعهما ٢٠ فإن ص = ...

(٢٠ - س ، س - ٢٠ ، س + ٢٠)

[٥] إذا كان : العدد س يزيد عن ضعف العدد ص بمقدار ٩ فإن : س = ...

(٢ ص - ٩ ، ٢ ص + ٩ ، ٩ ص - ٩)

[٦] عدداً س ، ص يزيد أحدهما عن الآخر بمقدار ٣ فإذا كان أصغرهما ص فإن : س = ...

(ص + ٣ ، ٣ ص ، ص - ٣)

[٧] مثلث متساوی الساقين محطيه ع و طول أحد ساقيه ل فإذا كان طول قاعده ٤ سم فإن : ع = ...

(٤ + ل ٢ ، ل ٢ - ٤ ، ل ٢ + ٥)

(٢) أكمل الجدول التالي :

التعبير الرمزي	التعبير الرمزي	مثال
$s + 4 = 9$	عدد إذا أضيف إليه ٤ ينتج ٩	[١]
	عدد إذا أضيف إليه ٣ ينتج ١٠	[٢]
	عدد إذا طرح منه ٦ ينتج ١١	[٣]
$0 = 1 + s$		[٤]
	ضعف عدد مضافاً إليه ٣ يساوى ٤	[٥]
	ضعف عدد مطروحاً منه ٩ يساوى ٣٣	[٦]
	ثلاثة أمثال مضافاً إليه ٥ يساوى ١٢	[٧]

(٣) أختر المعادلة التي تعبر عن الموقف التالي :

مع شادي ٠٥ جنيها اشتري قميصا بمبلغ  $s$  جنيهًا  
و تبقى معه ٩ جنيهات

(١)  $s - 9 = 0.5$

(٢)  $s + 9 = 0.5$

(٣)  $9 - s = 0.5$

(٤) أى المواقف التالية يعبر عن المعادلة :  $32 - s = 27$ (١) فصل به ٣٢ طالباً تغيب منهم  $s$  فكان عدد الحضور ٢٧


(٢) فصل به عدد من التلاميذ تغيب منهم ٢٧ وكان عدد الحاضرين ٣٢

(٣) فصل به ٣٢ بنتاً وأنضم إليهم  $s$  من البنات فكان العدد ٢٧

الدرس الثالث : المعادلات

معنى المعادلة :

لاحظ الشكلين التاليين :



إذا تعادلت (تساوت) الكفتان فإن :

وزن الدجاجة = ٣ كجم وزن كيس الدقيق = ٣ كجم

و إذا كان وزن الدجاجة =  $s$  كجم فإننا : نعبر عن  
عن وضع الميزان بالعلاقة

$s + 3 = 0$

هاتان العلاقاتان الرياضيتان تسميان : معادلة لأن هناك تعادلاً أو تساواً بين المقدارين

(١) عدد إذا أضيف إليه ٧ ينتج ١٤

أختر التعبير الرمزي الذي يعبر عن ذلك :

(١)  $s - 7 = 14$  (٢)  $s + 7 = 14$

(٣)  $7 - s = 14$  (٤)  $7 + s = 14$

من ذلك نستنتج :

إضافة (أو طرح ) مقادير متساوية لطرفى معادلة لا يؤثر على التساوى

ملاحظات :

(١) ضرب (أو قسمة) طرفى معادلة فى (على) مقادير متساوية لا يؤثر على التساوى

(٢) المتغير بالمعادلة و هو العدد المجهول (أى الذى لا نعرف قيمته) و لذلك نعبر عنه بالرمز : س أو ص أو .....

(٣) حل المعادلة :

يقصد بحل المعادلة :

إيجاد قيمة المجهول (الرمز) الذى تحتويه المعادلة

**مثال (١)** : أوجد العدد الذى إذا أضيف إليه ٤ كان الناتج ١٠

**الحل**

لاحظ : نفرض أن العدد هو : س

فتكون المعادلة التى تمثل هذه الجملة هي :

$$س + ٤ = ١٠$$


و لحل هذه المعادلة : نبحث عن العدد إذا أضيف إلى ٤ ليكون

$$\text{الناتج } 10 \text{ " نجد أنه } 6 \text{ " لأن: } 6 + 4 = 10.$$


$$\text{أى أن: } س + 4 = 6 + 4$$

إذن :  $س = 6$  و هو حل المعادلة


إذن مجموعة الحل = { 6 }




$$3 = 3$$



$$\text{أى: } س + 4 = 0$$



$$3 = 3$$



$$1 = 1$$

ملاحظات :

(١) في الشكل المقابل :

كفتا الميزان متعادلتان

فإذا كان وزن التفاح

س كجم فإننا نعبر عن

وضع الميزان بالمعادلة :  $س + 3 = 3$

و إذا أضفنا وحدتين إلى كل

من كفتى الميزان و كانت

كفتا الميزان متعادلتان

فإننا نعبر عن وضع الميزان

بالمعادلة :

$$س + 3 + 2 = 3 + 2$$

(٢) في الشكل الم مقابل :

كفتا الميزان متعادلتان

فإذا كان وزن البطيخة

س كجم فإننا نعبر عن

وضع الميزان بالمعادلة :  $س + 3 = 3$

و إذا رفينا وحدة واحدة من

كل من كفتى الميزان و كانت

كفتا الميزان متعادلتان

فإننا نعبر عن وضع الميزان

بالمعادلة :

$$س + 3 - 2 = 3 - 2$$

**مثال (٣) :** حل المعادلة :  $2s = 10$

**الحل**

لحل هذه المعادلة : نبحث عن العدد إذا ضرب في ٢ يكون الناتج ١٠ " نجد أنه ٥ " لأن :  $2 \times 5 = 10$   
أى أن :  $2s = 2 \times 5$  إذن :  $s = 5$   
و هو حل المعادلة إذن مجموعة الحل = {٥}

**حل آخر**

المعادلة هي :  $2s = 10$

و لحلها نقسم طرفي المعادلة على ٢ فيكون :  $\frac{s}{2} = \frac{10}{2}$   
أى :  $s = 5$  و هو حل المعادلة إذن مجموعة الحل = {٥}

**مثال (٤) :** حل المعادلة :  $3s + 0 = 14$

**الحل**

$$3s + 0 = 14$$

$$3s + 0 - 0 = 14 - 0 \quad (\text{طرح } 0 \text{ من الطرفين})$$


$$\frac{3s}{3} = \frac{14}{3} \quad (\text{قسمة الطرفين على } 3)$$

$$s = 3 \quad \text{إذن : مجموعة الحل = \{3\}}$$

**(٥) حل المعادلة :**  $s + 0 = 10$  أكمل :

العدد الذي يضاف إلى ٥ ليتُصبح ١٠ هو ....

و ذلك لأن : .... + ٥ = ١٠ **إذن :**  $s = ....$

**حل آخر**


المعادلة هي :  $s + 4 = 10$   
و لحلها نطرح ٤ من طرفي المعادلة  
فيكون :  $s + 4 - 4 = 10 - 4$   
أى :  $s = 6$  و هو حل المعادلة  
إذن مجموعة الحل = {٦}

**مثال (٦) :** أوجد العدد الذي إذا طرح منه ٤ كان الناتج ١٠

**الحل**

نفرض أن العدد هو :  $s$   
فتكون المعادلة التي تمثل هذه الجملة هي :  $s - 4 = 10$   
و لحل هذه المعادلة : نبحث عن العدد إذا طرح منه ٤ يكون  
الناتج ١٠ " نجد أنه ١٤ " لأن :  $14 - 4 = 10$   
أى أن :  $s - 4 = 14 - 4$

**إذن :**  $s = 14$  و هو حل المعادلة  
إذن مجموعة الحل = {١٤}

**حل آخر**

المعادلة هي :  $s - 4 = 10$   
و لحلها نضيف ٤ إلى طرفي المعادلة  
فيكون :  $s - 4 + 4 = 10 + 4$   
أى :  $s = 14$  و هو حل المعادلة  
إذن مجموعة الحل = {١٤}

(٤٠) أوجد قيمة س فى كل مما يلى :  
 ( دون استخدام الورقة و القلم أو الحاسبة )

$$١٣ + ٩ = ١٢ + \text{س} \quad [١]$$

$$٦ + ٧ = ٧ + \text{س} \quad [٢]$$

$$٧ \times ٧٧ = ٧ \text{ س} \quad [٤]$$

$$٣ \times ١١ = ٣ \text{ س} \quad [٣]$$

$$١٠ \times ٣ = ١٨ \times \text{س} + ٨ \times \text{س} \quad [٥]$$

$$١٧ \times ٥٤ = (\text{س} \times ٤) + (\text{س} \times ٥٠) \quad [٦]$$

$$(\text{س} \times ١٥) \times ٣٥ = ١٣ \times (\text{س} \times ١٥) \quad [٧]$$

(٤١) أختـر الإجـابة الصـحـيـحة من بـيـن الإـجـابـاتـ المـعـطـاـة :

$$\text{إذا كان : س} + ٨ = ٥ + \text{س} \quad , \quad \text{س} \in \text{ط} \quad [٨]$$

$$(\text{فـإنـ : سـ} = \text{....}) \quad (٣ ، ٨ ، ١٣)$$

$$\text{إذا كان : س} - ٩ = ٤ - \text{س} \quad , \quad \text{س} \in \text{ط} \quad [٩]$$

$$(\text{فـإنـ : سـ} = \text{....}) \quad (٩ ، ٠ ، ١٣)$$

$$\text{إذا كان : س} = ١٠ \quad , \quad \text{س} \in \text{ط} \quad [١٠]$$

$$(\text{فـإنـ : سـ} = \text{....}) \quad (٠ ، ٢ ، ٥٠)$$

$$\text{إذا كان : س} = ١٩ = ٧ + \text{س} \quad , \quad \text{س} \in \text{ط} \quad [١١]$$

$$(\text{فـإنـ : سـ} = \text{....}) \quad (٠ ، ٤ ، ٣)$$

$$\text{إذا كان : س} = ٩٤٥ = (\text{س} \times ١٠٠) + ٤٥ \quad [١٢]$$

$$(\text{فـإنـ : سـ} = \text{....}) \quad (٩ ، ٠ ، ٤)$$

$$\text{إذا كان : س} = ٨٥ \times ٦ = (٦ + ٧٥) \quad [١٣]$$

$$(\text{فـإنـ : سـ} = \text{....}) \quad (٨٥ ، ٨ ، ٦)$$

(٤٢) حلـ المعـادـلةـ : سـ = ٥ = ١٥ـ أـكـمـلـ :

إذا أضـفـناـ ٥ـ لـكـلـ مـنـ الطـرـفـيـنـ

$$\text{فـإنـ : سـ} = ٥ + ٥ = ١٠ \quad [١٤]$$

(٤٣) حلـ المعـادـلةـ : سـ + ٣ = ٥ـ أـكـمـلـ :

إذا طـرـحـناـ ٣ـ مـنـ كـلـ مـنـ الطـرـفـيـنـ

$$\text{فـإنـ : سـ} = ٣ - ٣ = ٠ \quad [١٥]$$

(٤٤) حلـ كـلـاـ منـ المـعـادـلاتـ التـالـيـةـ حـيـثـ : سـ  $\in$  طـ :

$$٩ = ١ + \text{س} \quad [١]$$

$$١٣ = ٨ + \text{ص} \quad [٤]$$

$$٨ = ١٨ - \text{ك} \quad [٦]$$

$$١٠ = ٣ - \text{o} \quad [٨]$$

$$١٠ = ٧ + \frac{١}{٧} \text{ س} \quad [١٠]$$

$$٣ = \frac{٣}{٣} \text{ س} \quad [٩]$$

(٤٥) حلـ كـلـاـ منـ المـعـادـلاتـ التـالـيـةـ :

$$٦ \times ٩ = ٩ \times \text{ل} \quad [١]$$

$$٤٢ \times ٩ = ٣٦ \times (\text{س} + ٧) \quad [٢]$$

$$٤٥ \times ٨ = ٤٠ \times (\text{س} + ٣٥) \quad [٤]$$

$$(١٠ \times ٥) + (١٠ \times ٧) + \text{س} = ٥٧٣ \quad [٥]$$

$$٣ + (١٠ \times ٤) + (\text{س} \times ٨) = ٤٨٣ \quad [٦]$$

$$(٨) \text{ مساحة المستطيل} = \text{الطول} \times \text{العرض}$$


$$\text{طويل المستطيل} = \frac{\text{مساحة المستطيل}}{\text{العرض}}$$

$$\text{عرض المستطيل} = \frac{\text{مساحة المستطيل}}{\text{الطول}}$$

و يتضح ذلك من الأشكال المقابلة بتظليل المطلوب

مساحة المستطيل		مساحة المستطيل		مساحة المستطيل	
الطول	العرض	الطول	العرض	الطول	العرض

(٩) لاحظ الشكل و الجدول التاليين :



مساحتة	محيطة	اسم الشكل	رقم الشكل
٤ وحدة مساحة	٨ وحدة طول	مربع	[١]
٩ وحدة مساحة	١٢ وحدة طول	مربع	[٢]
١٤ وحدة مساحة	١٨ وحدة طول	مستطيل	[٣]
٢٤ وحدة مساحة	٢٠ وحدة طول	مستطيل	[٤]

## الوحدة الثالثة

## الدرس الأول : المساحة و وحداتها

نعلم أن :

(١) محيط الشكل هو طول الخط الخارجي الذي يحدد هذا الشكل

(٢) محيط أي مضلع = مجموع أطوال أضلاعه

(٣) محيط المربع = طول ضلعه × ٤

، طول ضلع المربع =  $\frac{1}{4} \times \text{محيط المربع}$

(٤) محيط المستطيل =  $(\text{الطول} + \text{العرض}) \times ٢$

، طول المستطيل =  $\frac{1}{٢} \times \text{محطيه} - \text{عرضه}$

، عرض المستطيل =  $\frac{1}{٢} \times \text{محطيه} - \text{طوله}$

(٥) مساحة أي منطقة = عدد الوحدات المربعة التي تغطي هذا السطح

(٦) مساحة أي منطقة = مجموع مساحات الأجزاء المكونة لهذه المنطقة

(٧) مساحة المربع = طول الضلع × طول الضلع

لاحظ الجدول التالي لاستنتاج " أكمل الجدول بأعداد أخرى " :


[١] مساحة المربع إذا علم طول الضلع

[٢] طول ضلع المربع إذا علمت مساحة الضلع

نبحث عن عدد بحيث : العدد × العدد = مساحة المربع

.....	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	العدد
.....	٨١	٦٤	٤٩	٣٦	٢٥	١٦	٩	٤	١	العدد × العدد


## مساحة المثلث



، مساحة المثلث  $\frac{1}{2} \times 4 \times 4$  = مساحة المستطيل  $4 \times 4$

$$= \frac{1}{2} \times 4 \times 4 = 8 \text{ سم}^2$$

ثانياً : إذا كان :



مساحة المستطيل =  $4 \times 2 = 8 \text{ سم}^2$  ، مساحة المثلث =  $1 \text{ سم}^2$



مساحة المستطيل =  $3 \times 2 = 6 \text{ سم}^2$  ، مساحة المثلث =  $1,0 \text{ سم}^2$



مساحة المستطيل =  $3 \times 2 = 6 \text{ سم}^2$  ، مساحة المثلث =  $3 \text{ سم}^2$

(٤) وحدات قياس المساحة :

(١) السنديمتر المربع =  $1 \text{ سم}^2 = 100 \text{ مم}^2$


و هو مساحة مربع طول ضلعه ١ سم

(٢) المتر المربع ( $\text{م}^2$ ) =  $100 \times 100 = 10000 \text{ سم}^2$

(٣) الكيلومتر المربع ( $\text{كم}^2$ ) =  $1000 \times 1000 = 1000000 \text{ م}^2$

(٤) الديسيمتر المربع (ديسم $^2$ ) =  $10 \times 10 = 100 \text{ سم}^2$

ملاحظة :



مساحة المربع =  $4 \times 4 = 16 \text{ سم}^2$  مساحة المستطيل =  $4 \times 2 = 8 \text{ سم}^2$

المستطيل و المربع متساويان في المساحة

، المستطيل و المربع ليسا متطابقين

السطوح المتطابقة متساوية في المساحة و العكس ليس صحيح دائماً


و يتضح ذلك من الأشكال المقابلة بتظليل المطلوب

مساحة المثلث	
طول القاعدة	الارتفاع
$\frac{1}{2}$	


مساحة المثلث	
الارتفاع	طول القاعدة
$\frac{1}{2}$	

- (١) أكتب ما يعبر عن قاعدة المثلث والإرتفاع المناظر لهذه القاعدة  
ثم أوجد مساحة المثلث في ما يلى :



[١] القاعدة :  $b = \underline{\hspace{2cm}}$  ، الإرتفاع :  $\underline{\hspace{2cm}}$



[٢] القاعدة :  $\underline{\hspace{2cm}}$  ، الإرتفاع :  $\underline{\hspace{2cm}}$



[٣] القاعدة :  $\underline{\hspace{2cm}}$  ، الإرتفاع :  $\underline{\hspace{2cm}}$



$$\text{مساحة المستطيل } b \times h = 6 \times 4 = 24 \text{ سم}^2$$

$$\text{مساحة المثلث } \frac{1}{2} b h = \frac{1}{2} \times 6 \times 4 = 12 \text{ سم}^2$$

$$\text{مساحة } \Delta b h = \frac{1}{2} \text{ مساحة المستطيل } b h = \frac{1}{2} \times 6 \times 4 = 12 \text{ سم}^2$$


$$\text{مساحة } \Delta h b = \text{مساحة } \Delta b h + \text{مساحة } \Delta b h = 12 + 12 = 24 \text{ سم}^2$$

$$\frac{1}{2} \text{ مساحة المستطيل } b h = \frac{1}{2} \times 6 \times 4 = 12 \text{ سم}^2$$


مما سبق نستنتج : مساحة المثلث =  $\frac{1}{2}$  طول قاعدته × ارتفاعه

$$\text{، طول قاعدة المثلث} = \frac{\frac{1}{2} \text{ مساحة المثلث}}{\text{ارتفاع}}$$

$$\text{، ارتفاع المثلث} = \frac{\frac{1}{2} \text{ مساحة المثلث}}{\text{طول القاعدة}}$$



(٤) في الشكل المقابل :

 $\triangle ABC$  مسطّيل مساحته  $٥٠ \text{ سم}^٢$ ،  $BC = ١٦ \text{ سم}$  ،  $AB = ١٠ \text{ سم}$ ،  $BC = ١٦ \text{ سم}$ اكمّل لإيجاد : مساحة  $\triangle ABC$  :مساحة المستطيل  $\triangle ABC = ٥٠ \times ١٠ = ٥٠ \text{ سم}^٢$ إذن :  $٥٠ = ٥ \times ١٠$ و منها :  $٥ = \dots \text{ سم}$  ، وبما أن :  $BC = ١٦ \text{ سم}$ إذن :  $BC = \dots - \dots = \dots \text{ سم}$ إذن : مساحة  $\triangle ABC = \dots \times \dots = \dots \text{ سم}^٢$ 

(٥) في الشكل المقابل :



 $\triangle ABC$  مربع محيطه  $٦٠ \text{ سم}$ ،  $BC = \dots$  ،  $AB = \dots = ٣٥ \text{ سم}$ 

اكمّل لإيجاد :

مساحة الشكل  $\triangle ABC$ محيط المربع  $\triangle ABC = \dots \times \dots \times \dots \times \dots = \dots \times \text{ طول الצלع}$ إذن :  $٦٠ = \dots \times \dots \times \dots \times \dots$ و منها :  $٦ = \dots = \dots \text{ سم}$ وبما أن :  $BC = \dots = ٣٥ \text{ سم}$ إذن :  $BC = \dots - \dots = \dots \text{ سم}$ إذن : مساحة  $\triangle ABC = \dots \times \dots \times \dots = \dots \text{ سم}^٢$ 

(٥) أكمل الجدول التالي :

مساحة المثلث بالستيمترات المربعة	ارتفاع المثلث بالستيمترات	طول قاعدة المثلث بالستيمترات
....	٧	٨
٣٠	....	١٠
٢٧	٩	....
....	٠	١٤
٢٠٠	٦٨	....

(٣) أوجد مساحة  $\triangle ABC$  حيث  $\triangle ABC$  مستطيل في ما يلى :[١] مساحة  $\triangle ABC =$  ....[٢] مساحة  $\triangle ABC =$  ....


مساحة المستطيل  $\Delta$  بـ  $ه$  = ....  $\times$  .... سـ<sup>٢</sup>

$$بـ ه = بـ - ه - .... = .... - .... سـ$$

$$\text{مساحة } \Delta \Delta بـ ه = \frac{1}{2} \times بـ \times ه$$

$$.... = .... \times .... \times \frac{1}{2} =$$

$$\text{مساحة الشكل } \Delta هـ = \text{مساحة ....} - \text{مساحة ....} = .... - .... سـ<sup>٢</sup>$$



(٨) في الشكل المقابل :

مساحة مربع طول ضلعه ٨ سـ

$$هـ = هـ بـ ، بـ هـ = وـ$$

اكمـل لإيجـاد : مسـاحة  $\Delta$  هـ وـ ، مـسـاحة  $\Delta$  بـ هـ ، مـسـاحة  $\Delta$  هـ وـ ، مـسـاحة  $\Delta$  هـ وـ

مسـاحة المـربع  $\Delta$  بـ هـ = .... سـ<sup>٢</sup>

$$هـ = هـ بـ = .... \times \frac{1}{2} = وـ = بـ هـ$$

$$\text{مسـاحة } \Delta \Delta هـ وـ = .... \times .... \times \frac{1}{2} =$$

$$\text{مسـاحة } \Delta \Delta بـ هـ = .... \times .... \times \frac{1}{2} =$$

$$\text{مسـاحة } \Delta \Delta هـ وـ = .... \times .... \times \frac{1}{2} =$$

$$\text{مسـاحة } \Delta \Delta هـ وـ + \text{مسـاحة } \Delta \Delta بـ هـ + \text{مسـاحة } \Delta \Delta هـ وـ$$

$$.... = .... + .... + .... سـ<sup>٢</sup>$$

أحمد الشننو

و مـسـاحة المـربع  $\Delta$  بـ هـ = .... سـ<sup>٢</sup>

إذـن : مـسـاحة الشـكـل  $\Delta$  بـ هـ = .... + .... سـ<sup>٢</sup>

(٩) في الشـكـل المـقـابـل :

$\Delta$  بـ هـ تـ بـ هـ ، بـ هـ = ٣٠ سـ

$$، بـ هـ = ١٦ سـ ، بـ هـ = ٨ سـ$$

اـكمـل لإـيجـاد :

مسـاحة  $\Delta$  بـ هـ ، طـول بـ هـ

$$\text{مسـاحة } \Delta \Delta بـ هـ = \frac{1}{2} \times بـ \times ....$$

$$= .... \times .... \times \frac{1}{2} =$$

$$\text{مسـاحة } \Delta \Delta بـ هـ = \frac{1}{2} \times .... \times بـ هـ$$

$$\text{إـذـن : ....} = .... \times \frac{1}{2} =$$

$$\text{وـ منـها : بـ هـ} = \frac{.... \times ٣٠}{....} =$$

(١٠) في الشـكـل المـقـابـل :

مسـاحة مستـطـيل ، بـ هـ = ٨ سـ

$$، بـ هـ = ٥ سـ ، بـ هـ = ٤ سـ$$

اـكمـل لإـيجـاد : مـسـاحة المـسـطـيل  $\Delta$  بـ هـ

، مـسـاحة  $\Delta$  بـ هـ ، مـسـاحة الشـكـل  $\Delta$  هـ

أحمد الشننو

$$\text{مساحة المثلث} = \dots \times \dots \times \frac{1}{2} \times \text{سم}^2$$

$$\text{مساحة } \Delta = \frac{1}{2} \times \text{base} \times \text{height}$$

(٩) في الشكل المقابل

**م ب ح قائم الزاوية في ب  
رسم على أضلاعه الثلاث  
المربعات م ب س ص ،**

$$\Delta \text{ مساحة} = \frac{1}{2} \times \text{.....} \times \text{.....}$$

$$\text{مساحة المربع} = \text{ب س ص} = \text{سم}^2 = \dots \times \dots$$

$$\begin{array}{l} \text{مساحة المربع بـ حـ عـ نـ} = \dots \times \dots \\ \text{مساحة المربع بـ حـ عـ هـ} = \dots \times \dots \end{array}$$

ماذا تلاحظ؟

(١٠) مثلث طولا ضلعين فيه ٦ سم ، ٨ سم و محيطه ٢٤ سم  
و الارتفاع المنظر لأكبر الأضلاع هو ٤,٨ سم أكمل :

## **مجموع الضرائين المعلومين = .... + .... = .... سم**

طول الضلع الثالث = ..... = ..... = ..... س

(ii) أختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

[٤] المثلث الذى طول قاعدته ١٢ سم ، و الإرتفاع المناظر لهذه القاعدة هو ٥ سم تكون مساحته = .... سم٢

[٢] طول قاعدة المثلث الذى مساحته ٣٤ سم<sup>٢</sup> و الإرتفاع المناظر  
لهذه القاعدة هو : ١٠ سم تساوى سـم

[٣] مساحة مستطيل محیطه ١٦ سم ، و عرضه ٣ سم

(تساوی .... سم' ) ( ٤٨ ، ٣٩ ، ١٠ )

[٤] مساحة مربع طول ضلعه ٧ سم .... مساحة مثلث طول قاعدته ١٢ سم ، و الارتفاع المناظر لهذه القاعدة هو ٨ سم

[٥] مساحة مربع محيطه ٤٣ سم .... مساحة مثلث قائم الزاوية

فيه طولا ضلعى القائمة هما ٩ سم ، ٨ سم

[٦] مساحة مستطيل بعدها ٧ سم ، و سماحة مثلث طول قاعدته ٦ سم ، و الارتفاع المناظر لهذه القاعدة هو ٤ سم

Scilijm 108<sup>s</sup>

**إذن :** مساحة متوازي الأضلاع = طول القاعدة × الإرتفاع

**ملاحظات :**

(١) طول القطعة المستقيمة العمودية على أي ضلعين متقابلين لمتوازي أضلاع هي إرتفاع له و أي من هذين الضلعين هو القاعدة المناظرة

(٢) عدد إرتفاعات متوازي الأضلاع = ٢

(٣) يتساوى إرتفاعي متوازي الأضلاع إذا تساوت أضلاعه

(٤) مساحة متوازي الأضلاع = طول القاعدة الكبيرة × الإرتفاع الأصغر

= طول القاعدة الصغرى × الإرتفاع الأكبر

$$(٥) \text{ طول القاعدة الكبيرة} = \frac{\text{مساحة متوازي الأضلاع}}{\text{الارتفاع الأصغر}}$$

$$\text{، الإرتفاع الأصغر} = \frac{\text{مساحة متوازي الأضلاع}}{\text{طول القاعدة الكبيرة}}$$

$$(٦) \text{ طول القاعدة الصغرى} = \frac{\text{مساحة متوازي الأضلاع}}{\text{الارتفاع الأكبر}}$$



$$\text{، الإرتفاع الأكبر} = \frac{\text{مساحة متوازي الأضلاع}}{\text{طول القاعدة الصغرى}}$$

**مساحة متوازي الأضلاع**  
طول القاعدة الكبيرة | الإرتفاع الأصغر

**مساحة متوازي الأضلاع**  
طول القاعدة الصغرى | الإرتفاع الأكبر

و يتضح ذلك من  
الشكليين المقابلين  
بتظليل المطّلوب

## الدرس الثاني : مساحة متوازي الأضلاع



**نشاط تعهدى :**  
على قطعة من الورق المقوى ارسم  
متوازي الأضلاع  $\square ABCD$   
كما بالشكل المقابل  
و من الرأس  $D$  ارسم  $DH \perp AB$


افصل المثلث  $DHB$  و انتبه  
للوضع  $E$  و  $M$

لتحصل على المستطيل  $EDMH$   
ف تكون :

مساحة متوازي الأضلاع  $\square ABCD$   
= مساحة المستطيل  $EDMH$


**إذن :**

**مساحة متوازي الأضلاع = طول القاعدة × الإرتفاع**



**تحقق :**  
نعم أن : قطر متوازي الأضلاع  
يقسمه إلى مثلثين متطابقين

**إذن :** مساحة متوازي الأضلاع  $\square ABCD$   
= ضعف مساحة  $\triangle DAB$   
=  $2 \times \frac{1}{2} \text{ طول القاعدة} \times \text{الارتفاع}$



(٣) في الشكل المقابل :

$$\text{مساحة متوازي الأضلاع } b \times h = 12 \text{ سم أكمل :}$$

$$\text{مساحة متوازي الأضلاع } b \times h = \dots \times \dots = \dots \text{ سم}^2$$

$$\text{مساحة متوازي الأضلاع } b \times h = \dots \times \dots = \dots$$

$$\text{إذن : } h = \dots \text{ سم}$$

(٤) متوازي أضلاع محیطه ٨٠ سم ، مساحته ٣٠ سم٢ ، و طول الإرتفاع الأصغر ١٢ سم أكمل :

$$\text{طول القاعدة الكبرى} = \frac{\text{مساحة متوازي الأضلاع}}{\dots} = \dots \text{ سم}$$

$$\text{نصف محیط متوازي الأضلاع} = \dots \text{ سم}$$





$$\text{طول القاعدة الصغرى} = \dots - \dots = \dots \text{ سم}$$

$$\text{الارتفاع الأكبر} = \frac{\text{مساحة متوازي الأضلاع}}{\dots} = \dots \text{ سم}$$

(٤) أكمل الجدول التالي :

مساحة متوازي الأضلاع بالسنتيمترات المربعة	ارتفاع متوازي الأضلاع بالسنتيمترات	طول قاعدة متوازي الأضلاع بالسنتيمترات
....	٧	٨
٣٠	....	١٠
٢٧	٩	....
....	٠	١٤
٢٠,٠	٧,٠	....

(٥) أوجد مساحة متوازي الأضلاع في كل مما يلى :



مساحة متوازي الأضلاع = ....  $\times$  .... سم<sup>٢</sup>

و بما أن : مساحة متوازي الأضلاع = مساحة المثلث

إذن : مساحة المثلث = .... سم<sup>٢</sup>

ارتفاع المثلث المناظر لهذه القاعدة = .... سم

(٦) أختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

[١] عدد إرتفاعات متوازي الأضلاع = ....

(١ ، ٢ ، ٤)

[٢] إذا كان طولاً ضلعين متباينين في متوازي أضلاع ٥ سم

، ٧ سم و إرتفاعه الأصغر ٣ سم فإن مساحته = .... سم<sup>٢</sup>

(٢١ ، ١٥ ، ١٢)

[٣] إذا كان طولاً ضلعين متباينين في متوازي أضلاع ٥ سم

، ٧ سم و إرتفاعه الأكبر ٣ سم فإن مساحته = .... سم<sup>٢</sup>

(٢١ ، ١٥ ، ١٢)

[٤] متوازي أضلاع مساحته ٣٦ سم<sup>٢</sup> و طول أحد أضلاعه ٩ سم

فإن الإرتفاع المناظر لهذا الضرع = .... سم


(٢٧ ، ١٨ ، ٤)

[٥] مساحة مربع محيطه ٢٤ سم .... مساحة متوازي أضلاع طول

قاعدته ١٢ سم ، و إرتفاعه ٣ سم

( ) > ، = ، <

أحمد الشننو



(٥) في الشكل المقابل :

ب ب حاء متوازي أضلاع ،

ب و = و ح ، فإذا كان :

٤ ه = ١٠ سم ، ٤ ه = ٨ سم

أكمل ما يلى :

ب ح = .... سم ، ح و = .... سم

مساحة متوازي الأضلاع  $ب \times ح = ....$  سم<sup>٢</sup>

مساحة المثلث و ح = ....  $\times$  ....  $\times$  .... سم<sup>٢</sup>

مساحة الشكل  $ب + و = .... - ....$  سم<sup>٢</sup>

(٦) أيهما أكبر في المساحة :

متوازي أضلاع طول قاعدته ١٠ سم ، و إرتفاعه ٥ سم أم مثلث

طول قاعدته ١٢ ديسيم ، و إرتفاعه ٨ سم

ثم أوجد الفرق بين مساحتيهما

مساحة متوازي الأضلاع = ....  $\times$  .... سم<sup>٢</sup>

مساحة المثلث = ....  $\times$  .... سم<sup>٢</sup>

مساحة .... .... أكبر من مساحة .... ....

الفرق بين مساحتيهما = .... - .... سم<sup>٢</sup>

(٧) متوازي أضلاع طول قاعدته ١٢ سم ، و إرتفاعه المناظر لهذه

القاعدة ٦ سم ، و مساحته تساوى مساحة مثلث طول قاعدته

١٨ سم أوجد إرتفاع المثلث المناظر لهذه القاعدة

أحمد الشننو

**تذكرة :** مساحة المربع = طول الضلع × طول الضلع  
لاحظ الجدول التالي لاستنتاج " أكمل الجدول بأعداد أخرى " :

- [١] مساحة المربع إذا علم طول الضلع  
[٢] طول ضلع المربع إذا علمت مساحة الضلع  
نبحث عن عدد بحيث : العدد × العدد = مساحة المربع

.....	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	العدد
.....	٨١	٦٤	٤٩	٣٦	٢٥	١٦	٩	٤	١	العدد × العدد

**ملاحظة :**

لإيجاد طول القطر إذا علمت مساحته نتبع ما يلى :  
(١) توجد ضعف المساحة (أو : المساحة × ٢)

(٢) نبحث عن العدد الذي إذا ضرب في نفسه كان الناتج يساوى ضعف المساحة  
        " لاحظ الجدول السابق "

(١) أكمل لإيجاد مساحة مربع طول قطره ٦ سم

$$\text{مساحة المربع} = \frac{1}{2} \times \text{طول القطر} \times \text{طول القطر}$$

$$= \frac{1}{2} \times ٦ \times ٦ = \dots \dots \text{ سم}$$


(٢) أكمل لإيجاد طول قطر مربع طول مساحته ٢٤,٥ سم

$$\text{ضعف مساحة المربع} = \dots \dots$$

$$\text{طول قطر المربع} = \dots \dots \text{ سم}$$

$$\text{لأن : } \dots \dots \times \dots \dots =$$

### الدرس الثالث : مساحة المربع بمعلومية طول قطره



**نعم أن :**

في الشكل المقابل :

إذا كان :  $b^2 = d^2$  مربع فإن :

$$b^2 = b^2 = d^2 = d^2$$

" أضلاع المربع متساوية في الطول "  $b = d$  " قطر المربع متعاددان "

$b^2 = d^2$  " قطر المربع متساويان في الطول "

قطرا المربع ينصف كل منهما الآخر

$$\text{أى أن : } d^2 = b^2 = d^2 = \frac{1}{2} b^2 = \frac{1}{2} d^2$$

$$\text{أو : } d^2 = b^2 = d^2 = b^2 = b^2 = d^2$$

قطر المربع يقسمه إلى مثلثين متطابقين

و على ذلك يكون :

مساحة المربع = ضعف مساحة المثلث  $\frac{1}{2} b^2$

$$= \frac{1}{2} \times b^2 \times b$$


$$= \frac{1}{2} \times b^2 \times \frac{1}{2} b^2$$

$$= \frac{1}{2} b^2 \times b^2 = \frac{1}{2} b^2 \times b^2$$

$$= \frac{1}{2} \times \text{طول القطر} \times \text{طول القطر}$$

إذن :

$$\boxed{\text{مساحة المربع} = \frac{1}{2} \times \text{طول القطر} \times \text{طول القطر}}$$



(٥) في الشكل المقابل :

$\frac{1}{2} b^2$  مربع ، فإذا كان :  $b = 4$  سم

أكمل لإيجاد مساحة المربع  $\frac{1}{2} b^2$

بما أن :  $b = 4$  سم

إذن :  $b = 4$  .... سم

إذن : مساحة المربع  $\frac{1}{2} b^2 = \frac{1}{2} b \times b = \frac{1}{2} b^2$

$$4^2 = \dots \times \dots \times \frac{1}{2} =$$

(٦) أيهما أكبر في المساحة :

مربع طول ضلعه ١٠ سم أم مربع طول قطره ١٤ سم

مساحة المربع الأول =  $\dots \times \dots = \dots$  سم<sup>٢</sup>

مساحة المربع الثاني =  $\frac{1}{2} \times \dots \times \dots = \dots$  سم<sup>٢</sup>

إذن : مساحة المربع ..... أكبر من مساحة المربع ....

(٧) أيهما أكبر في المساحة :

مربع طول قطره ١٠ سم أم مثلث قائم الزاوية طولاً ضلع القائمة

١٠ سم ، ٨ سم

مساحة المربع =  $\frac{1}{2} \times \dots \times \dots = \dots$  سم<sup>٢</sup>

مساحة المثلث =  $\frac{1}{2} \times \dots \times \dots = \dots$  سم<sup>٢</sup>

إذن : مساحة ..... أكبر من مساحة .....

(٨) أكمل الجدول التالي :

مساحة المربع	طول ضلع المربع	
٦ سم <sup>٢</sup>	٦ سم	[١]
٢٥ سم <sup>٢</sup>	..... سم	[٢]
٨١ سم <sup>٢</sup>	..... سم	[٣]
..... سم <sup>٢</sup>	٧ سم	[٤]
١١ سم <sup>٢</sup>	١١ سم	[٥]
١٠٠ سم <sup>٢</sup>	..... سم	[٦]
١٢٣ سم <sup>٢</sup>	١٢ سم	[٧]

(٩) أكمل الجدول التالي :

مساحة المربع	طول قطر المربع	
٦ سم <sup>٢</sup>	٦ سم	[١]
٥٠ سم <sup>٢</sup>	..... سم	[٢]
١٦٢ سم <sup>٢</sup>	..... سم	[٣]
..... سم <sup>٢</sup>	٧ سم	[٤]
١١ سم <sup>٢</sup>	١١ سم	[٥]
٢٠٠ سم <sup>٢</sup>	..... سم	[٦]
١٢٣ سم <sup>٢</sup>	١٢ سم	[٧]

(١٠) قطعة أرض مربعة الشكل طول ضلعها ١٣ متراً زرع جزء منها على

شكل مربع طول قطره ١٦ سم

أكمل لإيجاد مساحة الجزء غير المزروع

$$\text{مساحة قطعة الأرض} = \dots \times \dots = \dots \text{م}^2$$

$$\text{مساحة الجزء المزروع} = \dots \times \dots \times \dots = \dots \text{م}^2$$

$$\text{مساحة الجزء غير المزروع} = \dots - \dots = \dots \text{م}^2$$

(١١) مربع طول قطره ١٠ سم و مساحته تساوى مساحة متوازى الأضلاع

طول قاعدته ١٠ سم أكمل لإيجاد ارتفاع متوازى الأضلاع المناظر  
لهذه القاعدة

$$\text{مساحة المربع} = \frac{1}{2} \times \dots \times \dots = \dots \text{سم}^2$$

$$\text{مساحة متوازى الأضلاع} = \text{مساحة المربع} = \dots \text{سم}^2$$

$$\text{ارتفاع متوازى الأضلاع} = \dots = \dots \text{سم}$$


(١٢) قطعة ورق مساحتها ٣١٢ سم<sup>٢</sup> قطعت منها ٨ مربعات متطابقة طول

قطر كل منها ٨ سم أكمل لإيجاد مساحة الجزء المتبقى من الورقة

$$\text{مساحة المربع الواحد} = \frac{1}{2} \times \dots \times \dots = \dots \text{سم}^2$$

$$\text{مساحة المربعات} = \dots \times \dots = \dots \text{سم}^2$$

$$\text{مساحة الجزء المتبقى من الورقة} = \dots - \dots = \dots \text{سم}^2$$



(٨) في الشكل المقابل :

مستطيل طوله ١٠ سم ، و عرضه ٧,٥ سم

رسم داخله مربع طول قطره ٨ سم

أكمل لإيجاد مساحة الجزء المظلل

$$\text{مساحة المستطيل} = \dots \times \dots = \dots \text{سم}^2$$

$$\text{مساحة المربع} = \frac{1}{2} \times \dots \times \dots = \dots \text{سم}^2$$

$$\text{مساحة الجزء المظلل} = \dots - \dots = \dots \text{سم}^2$$

(٩) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

[١] مساحة مربع طول قطره ٤ سم = .... سم<sup>٢</sup> (٣٦ ، ١٦ ، ٨ )

[٢] طول قطر المربع الذي مساحته ٥٠ سم<sup>٢</sup> يساوى .... سم  
( ١٠ ، ٥٠ ، ٠٥ )

[٣] المربع الذي محیطه ٣٢ سم تكون مساحته = .... سم<sup>٢</sup>  
( ٣٢ ، ٦٤ ، ١٢٨ )

[٤] مساحة مربع طول قطره ٦ سم .... مساحة مستطيل بعده  
( ٦ سم ، ٣ سم ) < ، = ، >

[٥] مساحة مربع طول قطره ١٢ سم .... مساحة متوازى الأضلاع  
طول قاعدته ١٤ سم ، و ارتفاعه ٥ سم  
( > ، = ، < )

## الدرس الرابع : مساحة المعين بمعلومية طولي قطرية

نعم أن :

أولاً : المعين هو متوازي أضلاع جميع أضلاعه متساوية في الطول  
لذا فإن :

قاعدتي المعين متساويتين في الطول

وارتفاعيه متساويان في الطول

و بما أن : مساحة متوازي الأضلاع = طول القاعدة × الارتفاع  
لذن :

مساحة المعين بمعلومية طولي ضلعه و إرتفاعه :


$$\text{مساحة المعين} = \text{طول ضلعه} \times \text{ارتفاعه}$$

ويتضح ذلك من الأشكال المقابلة بتظليل المطلوب

مساحة المعين
طول الضلع   الارتفاع

مساحة المعين
طول الضلع   الارتفاع

مساحة المعين
طول الضلع   الارتفاع



ثانياً : في الشكل المقابل :  
إذا كان : بـ بـ = بـ بـ معين فإن :

$$[٢] b = b = b = b$$

" أضلاع المعين متساوية في الطول " [٣]

$$b = b = b$$

" قطراً المعين متعاددان "

[٤] قطراً المربع ينصف كل منهما الآخر  
أى أن :  $b^2 = a^2 = \frac{1}{2} b^2$

$$a^2 = b^2 = \frac{1}{2} b^2$$

قطر المعين يقسمه إلى مثلثين متطابقين  
و على ذلك يكون :

مساحة المعين = ضعف مساحة المثلث بـ بـ

$$= \frac{1}{2} \times b \times a$$

$$= \frac{1}{2} \times b \times \frac{1}{2} b$$

$$= \frac{1}{2} b \times b$$

$$= \frac{1}{2} \text{ حاصل ضرب طولي قطرية}$$

لذن :

مساحة المعين بمعلومية طولي ضلعى قطرية :

$$\text{مساحة المعين} = \frac{1}{2} \text{ حاصل ضرب طولي قطرية}$$

(٢) أكمل الجدول التالي :

مساحة المعين	طول القطر الآخر	طول قطرى المعين	طول أحد قطرى المعين	
٥ سم	٩ سم	٦ سم	٦ سم	[١]
١٠ سم	٣ سم	.... سم	.... سم	[٢]
٣٢ سم	.... سم	٨ سم	٨ سم	[٣]
٥ مم	١٠ مم	٣,٦ سم	٣,٦ سم	[٤]
٢٢,٤ ديسٌم	.... سم	٦,٤ ديسٌم	٦,٤ ديسٌم	[٥]
٣٤ سم	٤٠ سم	٣ ....	٣ ....	[٦]

و يتضح ذلك من الأشكال المقابلة بتظليل المطلوب

مساحة المعين	طريقى المعين	طريقى المعين	
مساحة المثلث	طريقى المثلث	طريقى المثلث	$\frac{1}{2}$
مساحة المثلث	طريقى المثلث	طريقى المثلث	$\frac{1}{2}$
مساحة المثلث	طريقى المثلث	طريقى المثلث	$\frac{1}{2}$

(٣) أكمل الجدول التالي :

معين طولا قطرىه ٦ سم ، ٨ سم ، و طول ضلعه ٥ سم

أكمل لإيجاد مساحته إرتفاعه

$$\text{مساحة المعين} = \frac{1}{2} \times \text{طولا قطرىه} \times \text{ارتفاعه}$$

$$\text{مساحة المعين} = \frac{1}{2} \times ٦ \times ٨ = ٣٠ \text{ سم}^٢$$

، مساحة المعين = طول ضلعه × الإرتفاع

$$\text{مساحة المعين} = \text{ارتفاع} \times \text{ارتفاع}$$

$$\text{و منها : إرتفاع المعين} = ٥ \text{ سم}$$

طريقى المعين	ارتفاع المعين	مساحة المعين	
٦ سم	٩ سم	٣٠	[١]
١٠ سم	٣ سم	٣٠	[٢]
٦٠ سم	٧ سم	٣٠	[٣]
٤ سم	٧ سم	٣٠	[٤]
٠٠ سم	١١ سم	٣٠	[٥]
٢٤ سم	٨ سم	٣٠	[٦]

(٦) متوازي أضلاع طول قاعدته ١٥ سم ، وارتفاعه المناظر على تلك القاعدة يساوى ٦ سم ، ومساحته تساوى مساحة معين طول أحد قطريه ١٠ سم أكمل لإيجاد طول القطر الآخر للمعين

$$\text{مساحة متوازي الأضلاع} = \dots \times \dots = \dots \text{ سم}^2$$

$$\text{مساحة المعين} = \text{مساحة متوازي الأضلاع} = \dots \text{ سم}^2$$

$$\text{مساحة المعين} = \frac{1}{2} \text{ حاصل ضرب طولا قطرية} \times \dots \times 10 \times \text{طول القطر الآخر}$$

$$\text{إذن : طول القطر الآخر للمعين} = \dots \text{ سم}$$

(٧) معين طولا قطرية ١٥ سم ، ٨ سم ، ومساحته تساوى مساحة مستطيل طوله ١٠ سم أكمل لإيجاد محيط المستطيل

$$\text{مساحة المعين} = \frac{1}{2} \times \dots \times \dots = \dots \text{ سم}^2$$

$$\text{مساحة المستطيل} = \text{مساحة المعين} = \dots \text{ سم}^2$$

$$\text{مساحة المستطيل} = \dots \times \text{عرض} \times \dots = \dots$$

$$\text{إذن : عرض المستطيل} = \dots \text{ سم}$$

$$\text{محيط المستطيل} = (\dots + \text{عرض}) \times \dots = \dots \text{ سم}$$

(٤) معين محيطه ٤٠ سم ، وطولا قطرية ١٢ سم ، ١٦ سم أكمل لإيجاد طول ضلع المعين ، ومساحته وارتفاعه

$$\text{محيط المعين} = \text{طول ضلعه} \times \dots$$

$$40 = \text{طول ضلعه} \times \dots$$

$$\text{إذن : طول ضلع المعين} = \dots \text{ سم}$$

$$\text{مساحة المعين} = \frac{1}{2} \text{ حاصل ضرب طولا قطرية} \times \dots \times \frac{1}{2} = \dots \text{ سم}^2$$

$$\text{مساحة المعين} = \text{طول ضلعه} \times \text{ارتفاع}$$

$$= \dots \times \text{ارتفاع}$$

$$\text{و منها : ارتفاع المعين} = \dots \text{ سم}$$

(٥) أيهما أكبر في المساحة :

مربع طول قطره ١٠ سم أم معين طولا قطرية ١٦ سم ، ٦ سم

$$\text{مساحة المربع} = \frac{1}{2} \times \dots \times \dots = \dots \text{ سم}^2$$

$$\text{مساحة المعين} = \frac{1}{2} \times \dots \times \dots = \dots \text{ سم}^2$$

$$\text{إذن : مساحة ..... أكبر من مساحة .....}$$

[٣] المعين الذى محیطه ٤ سم ، و إرتفاعه ٩,٦ سم تكون

$$\text{مساحته} = \dots \text{ سم}^٢$$

(٩٦ ، ٤٨ ، ٢٤)

[٤] المعين الذى مساحته ٤٨ سم<sup>٢</sup> ، و إرتفاعه ٤,٨ سم

$$\text{يكون محیطه} = \dots \text{ سم}$$

(٤٨ ، ٤٠ ، ٣٠)

[٥] مساحة معين طولا قطرية ٢٤ سم ، ١٠ سم .... مساحة معين

طول ضلعه ١٠ سم ، و إرتفاعه ٨ سم

( > ، = ، < )

[٦] مساحة معين طولا قطرية ١٩ سم ، ٨ سم .... مساحة مربع

طول قطره ١٣ سم

( > ، = ، < )

[٧] مساحة معين طولا قطرية ٤ سم ، ١٠ سم .... مساحة مثلث

قائم الزاوية فيه طولا ضلعى القائمة ٦ سم ، ٨ سم

( > ، = ، < )



**تابع جديد زاكرولي على موقعنا**

<https://www.zakrooly.com>

(٨) قطعنا أرض متساويتان في المساحة ، الأولى على شكل مربع

و الثانية على شكل معين طولا قطرية ٨ أمتار ، ١٦ متراً

أكمل لإيجاد محیط القطعة المربعة الشكل

$$\text{مساحة قطعة الأرض الثانية ( المعين )} = \frac{١}{٢} \times \dots \times \dots \text{ م}^٢$$

$$\text{مساحة قطعة الأرض الأولى ( المربع )} = \dots \text{ م}^٢$$

$$\text{مساحة قطعة الأرض الثانية ( المعين )} = \dots \text{ م}^٢$$

$$\text{مساحة قطعة الأرض الأولى ( المربع )} = \text{طول الضلع} \times \dots$$

$$\text{....} = \text{طول الضلع} \times \dots$$

$$\text{إذن : طول ضلع المربع} = \dots \text{ م}$$

$$\text{محیط قطعة الأرض الأولى ( المربع )} = \text{طول الضلع} \times \dots$$

$$\text{....} = \dots \times \dots \text{ م}$$

(٩) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

[١] مساحة معين طولا قطرية ٣ سم ، ٤ سم تساوى .... سم<sup>٢</sup>

(١٢ ، ٧ ، ٦)

[٢] المعين الذى مساحته ٣٦ سم<sup>٢</sup> ، و طول أحد قطريه ٨ سم

يكون طول قطره الآخر = .... سم

(١٠ ، ٩ ، ٨)

**ملاحظة :** محيط الدائرة  $\frac{\text{محيط الدائرة}}{\text{طول قطرها}}$  لها نفس القيمة تقريباً و تساوى  $\frac{22}{7}$  أو  $3,14$

و تعرف بالنسبة التقريرية و يرمز لها بالرمز " ط " أو "  $\pi$  " و تقرأ " باى " أى أن :  $\pi = \frac{\text{محيط الدائرة}}{\text{طول قطرها}}$

أحمد الشننو/ri

$$\boxed{\text{محيط الدائرة} = \pi \times \text{طول القطر}}$$

إذن :

$$\text{حيث : } \pi \approx \frac{22}{7} \text{ أو } 3,14$$

$$\text{، طول القطر} = \frac{\text{محيط الدائرة}}{\pi}$$


(١) أكمل الجدول التالي :

محيط الدائرة	$\pi$	طول قطر الدائرة	طول نصف قطر الدائرة	الدائرة
..... سم	3,14	..... سم	..... سم	[١]
..... سم	$\frac{22}{7}$	٧	..... سم	[٢]
٤٤	$\frac{22}{7}$	..... مم	..... مم	[٣]
..... سم	3,14	٢٠ سم	..... سم	[٤]
..... سم	$\frac{22}{7}$	..... سم	10,0	[٥]

## الدرس الخامس : محيط الدائرة

**نشاط تعهيدى :**

أرسم ٣ دوائر مختلفة على ورق مقوى كما بالشكل التالي :



أحمد الشننو/ri

باستخدام الخيط و الدبوس و قس طول قطر كل دائرة إذا كان قياسك دقيقاً ستجد ببيانك كما بالجدول التالي :

الدائرة	محيط الدائرة	طول قطر الدائرة	محيط الدائرة	الدائرة
الدائرة ١	12,6	4	15,7	الدائرة ٣
الدائرة ٢	22	7	15,7	الدائرة ١
الدائرة ٤	31,4	10	31,4	الدائرة ٥

يمكن إجراء عملية القسمة باستخدام الآلة الحاسبة

إذن : الفرق بين محيطي الدائرتين = .... - .... = .... سم

(٦) عجلة دراجة طول قطرها ٧٧ سم أكمل لإيجاد المسافة التي تقطعها العجلة عند دورانها دورة كاملة إذا دارت العجلة ... دورة

$$\left( \pi = \frac{22}{7} \right)$$

الدوره الكامله = محيط عجلة الدراجة =  $\pi \times$  طول القطر

$$\text{....} \times \text{....} = \text{....}$$

المسافة التي تقطعها العجلة إذا درات ... دورة =

$$\text{....} \times \text{....} = \text{....}$$

(٧) عجلة دراجة طول نصف قطرها ١٤ سم أكمل لإيجاد المسافة التي تقطعها العجلة عند دورانها دورة كاملة و عدد الدورات التي تدورها العجلة لقطع مسافة ١٤٠.٨ سم

$$\left( \pi = \frac{22}{7} \right)$$

الدوره الكامله = محيط عجلة الدراجة =  $\pi \times$  طول القطر

$$\text{....} \times \text{....} = \text{....}$$

عدد الدورات التي تدورها العجلة لقطع مسافة ١٤٠.٨ سم =

$$\text{....} \div \text{....} = \text{....} \text{ دورة}$$

(٨) دائرة محيطها ٨٨ سم أكمل لإيجاد طول نصف قطرها

$$\left( \frac{22}{7} = \pi \right)$$

محيط الدائرة =  $\pi \times$  طول القطر

$$88 = \frac{22}{7} \times \text{طول القطر}$$

إذن : طول القطر = .... سم

إذن : طول نصف القطر = .... سم

(٩) دائرة طول نصف قطرها ٥٠ سم أكمل لإيجاد محيطها

$$\left( \pi = 3,14 \right)$$

بما أن : طول نصف القطر = ٥٠ سم

إذن : طول القطر = .... سم

إذن : محيط الدائرة =  $3,14 \times \text{....} = \text{....}$  سم

(١٠) دائرتان طول نصف قطر الدائرة الأولى ١٠ سم ، طول قطر الدائرة


الثانية ٤ سم أكمل لإيجاد الفرق بين محيطي الدائرتين

$$\left( \pi = 3,14 \right)$$

طول قطر الدائرة الأولى = .... سم

إذن : محيط الدائرة الأولى = ....  $\times$  .... = .... سم

، محيط الدائرة الثانية = ....  $\times$  .... = .... سم




(٩) في الشكل المقابل :

إذا كانت م مركزاً لنصف دائرة طول قطرها ب = ١٤ سم أكمل لإيجاد

$$\text{محيط الجزء المظلل} (\pi = \frac{22}{7})$$

$$\text{محيط الجزء المظلل} = \text{طول .....} + \text{محيط .....}$$

$$..... = ..... \times ..... + ..... =$$



(١٠) في الشكل المقابل :

إذا كانت ن مركزاً لنصف دائرة طول قطرها ١٤ سم ، م، ن مركزى

لنصف دائرتين طول قطر كل منها


$$\text{قطرها ٧ سم أكمل لإيجاد محيط الجزء المظلل} (\pi = \frac{22}{7})$$

$$\text{محيط الجزء المظلل} = \text{محيط نصف الدائرة ن} + \text{محيط نصف}$$

$$\text{الدائرة م} + \text{محيط نصف الدائرة ن}$$

$$..... \times ..... + ..... \times ..... =$$

$$..... = ..... - ..... =$$



(١١) في الشكل المقابل :

دائرة مرسومة داخل مربع طول ضلعه ٧ سم

$$\text{أكمل لإيجاد محيط الجزء المظلل} (\pi = \frac{22}{7})$$

$$\text{محيط الجزء المظلل} = \text{محيط .....} + \text{محيط .....}$$

$$..... = ..... + ..... =$$

أحمد الشننو

(٧) يمتلك رجل قطعتين من الأرض الأولى على شكل دائرة طول قطرها

٧.٣٦ متراً و الثانية على شكل مستطيل طوله ٦٤ متراً و عرضه

١٠ مترًا ، يريد أن يحيطهما بسلاك يتكلف المتر منه ١٠ جنيهات

$$\text{أكمل لإيجاد أي القطعتين تتكلف أكثر} (\pi = \frac{22}{7})$$

$$\text{محيط القطعة الأولى} = ..... \times ..... = ..... \text{ متراً}$$

$$\text{تكلفة القطعة الأولى} = ..... \times ..... = ..... \text{ جنيهاً}$$

$$\text{محيط القطعة الثانية} = (..... + ..... \times ..... ) = ..... \text{ متراً}$$

$$\text{تكلفة القطعة الثانية} = ..... \times ..... = ..... \text{ جنيهاً}$$

القطعة ..... تكلف أكثر

(٨) في الشكل المقابل :

نافذة على هيئة مستطيل طوله ١٠٠ سم و عرضه

٧ سم يعلوه نصف دائرة ينطبق قطرها على

عرض المستطيل أكمل لإيجاد محيط النافذة

$$(\pi = \frac{22}{7})$$


$$\text{محيط الشكل} = (..... \text{ المستطيل} \times ٢) + ..... \text{ المستطيل}$$

محيط ..... =

$$(..... \times ..... \times ..... ) + ... + (... \times ...) =$$


$$..... = ..... + ..... + ..... =$$

أحمد الشننو



رقم الشكل	اسم الشكل	عدد خطوط التماثل
[١]	شبه منحرف	١
[٢]	مثلث مختلف الأضلاع	٠
[٣]	متوازي أضلاع	٢
[٤]	شبه منحرف متساوي الساقين	١
[٥]	مثلث متساوي الساقين	١
[٦]	معين	٢
[٧]	مستطيل	٢
[٨]	مثلث متساوي الأضلاع	١
[٩]	مرربع	٢

## التحويلات الهندسية

الوحدة الرابعة  
الدرس الأول : الأشكال المتماثلة و محور التمايز

في مجموعة الأشكال المقابلة يلاحظ وجود خط مستقيم يقسم كل شكل إلى جزئين متماثلين يعرف بخط التمايز أو محور تماثل الشكل و إذا طوينا الورقة المرسوم عليها الشكل عند محور التمايز ينطبق نصفاً الشكل كل على الآخر تمام الإنطباق


أى أن :

**خط التمايز** : يقسم الشكل إلى جزئين متطابقين

ملاحظة :


بعض الأشكال الهندسية لها خط تماثل أو أكثر " و تعتبر أشكالاً متماثلة " و بعضها ليس لها أي خط تماثل " و تعتبر أشكالاً غير متماثلة "

(١) لاحظ محاور تماثل الأشكال التالية ثم أكمل الجدول :




ملاحظة :

يكون المستقيم  $L$  محور تماّثٍ للشكل إذا كان لكل نقطة على الشكل نقطة تماّثٍ لها بالنسبة للمستقيم  $L$  و تقع على الشكل نفسه




ففي كل شكل من الأشكال السابقة :  
المستقيم  $L$  محور تماّثٍ لكل شكل ، لأن لكل نقطة من نقط الشكل نقطة تماّثٍ لها بالنسبة للمستقيم  $L$  و تقع على الشكل نفسه


(١) في كل شكل من الأشكال التالية ارسم محور تماّثٍ للشكل :




أحمد الشننو



- (١) ما يعكس الشكل (الإعكاس)  
يعكس الشكل في نقطة أو في  
مستقيم يسمى محور الإعكاس



- (٢) ينقل الشكل مسافة معينة  
في إتجاه معين  
(الانتقال)




- (٣) يدور الشكل حول نقطة بزاوية محددة  
(الدوران)

أحمد الشننو


**التحويلة الهندسية :**

تحول كل نقطة و لتكن  $M$  في المستوى إلى النقطة  $M'$  في المستوى نفسه

(٣) صنف نوع التحويلة الهندسية (إنعكاس - إنتقال - دوران )  
التي تجعل الشكل المظلل صورة للشكل غير المظلل في ما يلى :




### الانعكاس




نشاط تمهيدى :  
ارسم  $\triangle MBD$  على ورقة مربعات  
كما بالشكل المقابل  
ضع مرآة مستوية على أحد الخطوط  
مثلاً  $L$  بحيث تكون المرآة رأسية كما  
بالشكل لاحظ انعكاس صورة  $\triangle MBD$   
في المرآة ، و نجد :  
 $M' = MB$  ،  $B' = BD$  ،  $M' D = BD$  أي أن :  
أطوال أضلاع المثلث الأصلي تساوى أطوال الأضلاع المناظرة لصورته  
، أطوال القطع المرسومة من كل رأس من رؤوس المثلث  
الأصلي و صورته المناظرة له عمودية على المستقيم  $L$   
الشكل السابق يمثل تحويلة هندسية تسمى : انعكاساً  
و يسمى المستقيم  $L$  ( حافة المرأة ) : محور الانعكاس

### الانعكاس في مستقيم



صورة نقطة بالانعكاس :  
لإيجاد صورة النقطة  $M$  بالانعكاس في  
المستقيم  $L$  ( حيث :  $M \neq L$  ) :  
نرسم من النقطة  $M$  عموداً على المستقيم  
 $L$  يقطعه في نقطة  $H$  مثلاً ، و نأخذ  
 $HM = MH$  بحيث :  $M \rightarrow M'$   
فتكون : النقطة  $M'$  هي صورة النقطة  $M$  بالانعكاس في  $L$   
، إذا كانت :  $B \in L$  فإن : النقطة  $B'$  تنطبق على النقطة  $B$   
أى أن : صورة النقطة  $B$  هي نفسها





[٤] صورة  $\Delta ABC$  بالانعكاس فى  $L$  هي : ....

....  $\Delta \equiv \Delta LBC$

....  $L(BC) =$  ....


[٨] في الشكل المقابل أكمل :

[١] صورة النقطة  $H$   $\Delta$  هو و بالانعكاس فى  $L$  هي : ....

[٢] صورة النقطة  $B$   $\Delta$  هو و بالانعكاس فى  $L$  هي : ....

[٣]  $\Delta HED$  و صورة  $\Delta BEH$  و بالانعكاس فى  $L$  هي : ....

[٤]  $\Delta BHE$  و صورة  $\Delta BEH$  و بالانعكاس فى  $L$  هي : ....



(٥) في الشكل المقابل :

$\Delta ABC$  قائم الزاوية في  $B$

[١] ارسم صورة  $\Delta ABC$  بالانعكاس في  $L$  ثم أكمل :

....  $=$  ....

[٢]  $L(ABC) =$  ....

° .... =

[٣] ارسم صورة  $\Delta ABC$  بالانعكاس في  $L$

[٤] ارسم صورة  $\Delta ABC$  بالانعكاس في  $L$

(٦) في الشبكة التربيعية المقابلة :

ارسم المستطيل  $MBCN$



ثم ارسم :


[١] المستطيل  $MBCN$  و بالانعكاس

في  $MBCN$

[٢] المستطيل  $MBCN$  و بالانعكاس

في  $MBCN$





**ثانياً :** إذا كان الشعاع رأسياً في الشكل المقابل : الشعاع الرأسى و متساوية بـ من النقطة (و) التي تمثل العدد (صفر)

(٢) في الشكل المقابل أكمل :

[١] حدد نقطة م تمثل العدد ٣

[٢] حدد نقطة ب تمثل العدد ١٠

[٣] طول ب = ..... - ..... = .... وحدات طول

[٤] إذا كانت : النقطة ح التي تقع في منتصف المسافة

بين م ، ب فإن : طول و = ..... وحدات طول

**ثالثاً :** تحديد نقط في المستوى الإحداثي

إذا رسمنا الشعاع الأفقي و

، الشعاع الرأسى و ص ينشأ المستوى الإحداثي الموضع

بالشكل المقابل و الذى يحدد

موضع كل نقطة فى مستوى

الصفحة بزوج مرتب ، و

كل زوج مرتب يحدد نقطة

واحدة في المستوى ، أى أن

كل زوج مرتب يناظر نقطة


واحدة في المستوى الإحداثي

فمثلاً : النقطة م تناozر الزوج

المرتب (٤ ، ٣) ، س

و تكتب : م (٤ ، ٣)

بالمثل : ب (٣ ، ٤) ، ح (٨ ، ٢)



## الدرس الثاني : تحديد مواضع أعداد على شعاع

**أولاً :** إذا كان الشعاع أفقياً في الشكل المقابل :

الشعاع الأفقي و م متساوية بـ من النقطة (و)

التي تمثل العدد (صفر) و يليه الأعداد : ١ ، ٢ ، ٣ ، ...

فإذا كانت : النقطة م تمثل العدد ٥ ، والنقطة ب تمثل العدد ٩ فإن :

طول ب - م = ٩ - ٥ = ٤ وحدات طول  
لاحظ :

طول و - م = ٥ وحدات طول ،

طول و ب = ٩ وحدات طول

(١) في الشكل المقابل أكمل : س - ب - و

[١] طول و - م = ..... وحدات طول

[٢] طول و ب = ..... وحدات طول

[٣] طول ب - م = ..... - ..... = .... وحدات طول

[٤] حدد النقطة ح التي تمثل العدد ٩


[٥] طول و - ح = ..... وحدات طول

[٦] طول ب - ح = ..... - ..... = .... وحدات طول

[٧] طول ب - ح = ..... - ..... = .... وحدات طول

[٨] طول ب - ..... طول ب - ح < ، = ، >

(٤) في المستوى الإحداثي من الشكل المقابل أكمل :



[٨] صورة  $M$  بالانعكاس في  $L$  هي  $M'$  (.....، ....)

[٩] صورة  $B$  بالانعكاس في  $L$  هي  $B'$  (.....، ....)

[١٠] صورة  $H$  بالانعكاس في  $L$  هي  $H'$  (.....، ....)


[١١] صورة  $E$  بالانعكاس في  $L$  هي  $E'$  (.....، ....)

[١٢] صورة الشكل  $M$  بـ  $H$  بـ  $E$  بالانعكاس في  $L$  هي ....

**ملاحظات :**  
 (١) لاحظ الفرق بين  $(4, 3)$  ،  $(3, 4)$  و موضع النقطة التي يحددها كل منها في المستوى الإحداثي و يكون :  $(4, 3) \neq (3, 4)$

(٢) لاحظ الفرق بين  $\{4, 3\}$  ،  $\{3, 4\}$  حيث :  $(4, 3)$  هو زوج مرتب (الترتيب مهم)  $\{4, 3\}$  هو مجموعة (الترتيب ليس مهم) و يكون :  $\{4, 3\} = \{3, 4\}$

(٣) في المستوى الإحداثي من الشكل المقابل أكمل :




[٨] صورة  $M$  بـ  $H$  بالانعكاس في  $L$  هي ....  
 في المستقيم  $L$  هي  $M'$  (.....، ....)

[٣] مساحة الشكل بـ  $\text{م}^2$  = .... وحدة مساحة

[٤] إذا كان  $\leftrightarrow$  محور انعكاس للشكل بـ  $\text{م}^2$  عين صورة الشكل مستخدماً الرموز المناسبة ثم حدد كلاً من الأزواج المرتبة التي تمثل الرؤوس

.....

(٦) في المستوى الإحداثي بالشكل المقابل : ارسم الشكل



بـ  $\text{م}^2$  حيث :

٢ (٠،٤) ،

ب (٦،٠) ،

ح (٠،٦) ،

٤ (٠،٤) ثم اكمل :

الشكل بـ  $\text{م}^2$

يسمى ....

[٧] مساحة  $\Delta$  و  $\square$  =

وحدة مساحة = ....

[٨] مساحة  $\Delta$  و  $\square$  =

وحدة مساحة = ....

[٩] مساحة الشكل بـ  $\text{م}^2$  = مساحة .... - مساحة ....

= .... وحدة مساحة

= .... - .... = .... وحدة مساحة

أحمد الشننو

(١٠) في المستوى الإحداثي بالشكل المقابل : ارسم الشكل

بـ  $\text{م}^2$  حيث :

٢ (٣،٣) ،

ب (٣،٨) ،

ح (٦،٨) ،

٤ (٦،٣) ثم اكمل :

الشكل بـ  $\text{م}^2$

يسمى ....

[١١] محيط الشكل بـ  $\text{م}$

= .... وحدة طول س

[١٢] مساحة الشكل بـ  $\text{م}^2$

= .... وحدة مساحة

(١٣) في المستوى الإحداثي

بالشكل الم مقابل : ارسم الشكل

بـ  $\text{م}^2$  حيث : ٢ (٠،٥)

، ب (٠،٩) ، ح (٤،٩)

، ٤ (٤،٥) ثم اكمل :

الشكل بـ  $\text{م}^2$

يسمى ....

[١٤] محيط الشكل بـ  $\text{م}$

= .... وحدة طول س

أحمد الشننو

(٢) في بداية العام الدراسي أستطاع معلم الصف الخامس بإحدى المدارس الإبتدائية رأى متعلمي هذا الصف بالمدرسة عن الأنشطة المدرسية التي يفضلون الانضمام إليها و سجل البيانات في جدول كالتالى :

النحو	الكلمات	النشاط
٤٥		رياضي
٣٣		اجتماعي
....	/ / / / / / / / / /	فني
....	/ / / / / / / / / /	ثقافي

أكمل الجدول التكراري ثم أكمل :

[١] أكثر الأنشطة التي انضم إليها المتعلمين هي النشاط ....

[٢] أقل الأنشطة التي انضم إليها المتعلمين هي النشاط ....

[٣] الفرق بين عدد المتعلمين الذين انضموا للنشاط الرياضي و النشاط الفني = .... - .... = .... متعلم

[٤] الفرق بين عدد المتعلمين الذين انضموا للنشاط الاجتماعي و النشاط الثقافي = .... - .... = .... متعلم

[٥] الفرق بين عدد المتعلمين الذين انضموا للنشاط الرياضي و النشاط الثقافي = .... - .... = .... متعلم

## الإحصاء

### الدرس الأول : تجميع البيانات

نعم أن :

من أساليب جمع البيانات : الملاحظة ( العد و التسجيل و القياس ) ، و التجارب ، و الدراسات الميدانية ( إستطلاع رأى )

(١) سجل المعلم المشرف على مقصف المدرسة بإحدى المدارس عدد التلاميذ المترددين على المقصف في الفسحة لمدة أسبوع دراسي فكان كما يلى :

اليوم	العلامات	النحو
الأحد	/ / / /	.....
الاثنين	/ / / /	.....
الثلاثاء	/ / / / / /	.....
الأربعاء	/ / / / / / /	.....
الخميس	/ / / / / / / /	.....

أكمل الجدول ثم أجب عما يلى :

[١] عدد التلاميذ المترددين على المقصف المدرسي خلال هذا الأسبوع .... =


[٢] اليوم الذي يتردد فيه أكبر عدد من التلاميذ هو يوم ....

[٣] اليوم الذي يتردد فيه أقل عدد من التلاميذ هو يوم ....

و بحذف عمود العلامات نحصل على الجدول التكراري البسيط التالي :

الأجر	الكرار
٣٩	٤
٣٧	٠
٣٥	٦
٣٤	٥
٣٢	٣
٣٠	٧
٢٩	٠
٢٦	٣
٢٥	٢

و تمثيل هذه البيانات بالأعمدة يكون كما يلى : عدد العمال



و يلاحظ :

- (١) الحد الأعلى للأجر هو : ٣٩ جنيهاً (أكبر قيمة في البيانات)
- (٢) الحد الأدنى للأجر هو : ٢٥ جنيهاً (أقل قيمة في البيانات)
- (٣) أكبر قيمة للبيانات - أقل قيمة للبيانات =  $39 - 25 = 14$
- (٤) المدى = أكبر قيمة - أقل قيمة
- (٥) الجدول التكراري البسيط غير مجد لمعرفة أو استنتاج أي بيانات

## الدرس الثاني : تنظيم و عرض البيانات

يتم تنظيم و عرض البيانات في جدول كما يتضح مما يلى :

### أولاً : الجدول التكراري البسيط

تتضح خطوات تكوين جدول تكراري بسيط من خلال المثال التالي :  
يوضح الجدول التالي أجر مجموعه من عمال أحد المصانع

٢٦	٢٩	٢٦	٣٢	٣٤	٣٦	٢٤	٢٦	٢٦	٣٥
٢٦	٣٤	٢٢	٣٧	٢٥	٢٠	٢٨	٤٠	٢٥	٣٣
٢٥	٢٩	٣٠	٣٨	٢١	٣٤	٣٠	٢١	٢٦	٣٥
٢٧	٢٨	٢٩	٣٣	٢٠	٢٥	٢٦	٢٣	٣٦	٣٠

لتكوين جدول تكراري بسيط تكون أولاً جدول التفريغ التالي :

الاجر	العلامات	عدد العمال (الكرار)
٢٥	//	٢
٢٦	///	٣
٢٩	\\\\	٥
٣٠	// \\\	٧
٣٢	///	٣
٣٤	\\\\	٥
٣٥	/ \\\	٦
٣٧	\\\\	٥
٣٩	////	٤


فتكون عناصر المجموعة الأولى هي : ٢٥ ، ٣٦ ، ٢٩ و تكتب :  
 (٢٥ - ) و تغنى : الأجر من ٢٥ جنيهًا إلى أقل من ٣٠ جنيهًا  
 و بالمثل المجموعة الثانية (٣٠ - ) ، و المجموعة الثالثة (٣٥ - )  
 ثم نكمل جدول التفريغ التالي :

النكرار	العلامات	المجموعات
١٠	٢٥ ٢٦	- ٢٥
١٥	٢٦ ٢٧ ٢٨	- ٣٠
١٥	٢٨ ٢٩ ٣٠	- ٣٥

و يكون الجدول التكراري ذي المجموعات كما يلى :

النكرار	٣٥	٣٠	٢٥	المجموعات
٤٠	١٥	١٥	١٠	٢٥ ٢٧ ٢٨

و تمثيل هذه البيانات بالأعمدة يكون كما يلى :



ثانيًا : الجدول التكراري ذي المجموعات

يتم تكوينه من خلال الخطوات التالية :

(١) تحديد أصغر قيمة و لتكن  $a$  و أكبر قيمة و لتكن  $b$

(٢) تعين المدى الذي تشير إليه البيانات حيث :

المدى = أكبر قيمة - أقل قيمة =  $b - a$

(٣) تقسيم مجموعة البيانات إلى عدد مناسب من المجموعات الجزئية المنفصلة و المتساوية الطول

(٤) تكوين جدول تفريغ عموده الأول للمجموعات الجزئية و الثاني للعلامات التكرارية و الثالث للتكرارات

(٥) باستبعاد عمود العلامات من جدول التفريغ نحصل على الجدول التكراري ذي المجموعات

من بيانات المثال السابق :

٢٦	٢٩	٢٦	٣٢	٣٤	٣٦	٣٤	٢٤	٢٦	٢٦	٢٥
٢٦	٣٤	٢٢	٣٧	٢٥	٢٠	٢٨	٤٠	٢٥	٣٣	٣٣
٢٥	٢٩	٣٠	٣٨	٢١	٣٤	٣٠	٢١	٢٦	٢٥	٢٥
٢٧	٢٨	٢٩	٣٣	٢٠	٢٥	٢٦	٢٣	٣٦	٣٠	٣٠


نجد :

الحد الأعلى للأجور هو : ٣٩ جنيهًا (أكبر قيمة في البيانات)

الحد الأدنى للأجور هو : ٢٥ جنيهًا (أقل قيمة في البيانات)

المدى =  $39 - 25 = 14$

نقسم مجموعة البيانات إلى مجموعات جزئية كل منها = ٥ جنيهات



[٣] مثل هذه البيانات بالأعمدة

[٤] البيانات التالية تبين أوزان ٤٠ تلميذاً مقربة لأقرب كيلو جرام

٤٠	٤٤	٥٠	٤٥	٣٨	٤٦	٤٠	٤٢	٣٩	٣٥
٤٣	٤٠	٤٨	٣٨	٣٧	٤٠	٣٦	٤٩	٣٥	٣٦
٤٠	٣٦	٣٨	٤٢	٤٨	٣٦	٣٨	٣٥	٤٤	٤٦
٤٠	٤١	٥٠	٣٥	٣٨	٣٦	٣٩	٤٧	٤٥	٣٩

[١] أكمل :

[١] أكبر قيمة = .... [٢] أصغر قيمة = ....

[٣] المدى = .... - .... = ....

[٤] كون جدول تكراري ذي مجموعات لهذه البيانات بحيث تكون مجموعاته متساوية الطول و طول كل منها ٣ تلاميذ

[١] البيانات التالية تبين يبين عدد التلاميذ المترددين على مكتبة مشتركة في مشروع ( القراءة للجميع ) خلال ٣٠ يوماً

٣٣	٤٢	٣٨	٤٧	٣٠	٣٨	٣٦	٣٢	٤٦	٤٠
٣٤	٣٥	٢٧	٤٣	٢٧	٠٠	٤٨	٣٥	٣٤	٢٠
٢٨	٢٤	٣٨	٤٠	٤٤	٠٠	٤٢	٢٢	٢٤	٣٩

[١] أكمل :

[١] أكبر قيمة = .... [٢] أصغر قيمة = ....

[٣] المدى = .... - .... = ....

[٤] كون جدول تكراري ذي مجموعات لهذه البيانات بحيث تكون مجموعاته متساوية الطول و طول كل منها ٥ تلاميذ

المجموعات	العلامات	المجموعات
		-٢٠
		-٢٥

المجموعات	المجموع	المجموعات	النوع
		-٢٥	-٢٠

(٣) الجدول التالي يبين عدد القصص التي قرأها ٥ تلميذاً خلال العام

ڈرائی

أكمل [١]

$$\text{أكبر قيمة} = \dots = \text{أصغر قيمة} \quad (٢)$$

$$\dots = \dots - \dots = \text{المدى } (3)$$

[٢] كون جدول تكراري ذي مجموعات لهذه البيانات بحيث تكون مجموعاته متساوية الطول و طول كل منها ٣ قصص


النحو	الحالات	المجموعات
		- ٠
		- ٣

سی ایمیں ۱۰۲

النحو	الحالات	المجموعات
		- ٣٥
		- ٣٨

المجموع	-	٣٨	-	٣٥	المجموعات
					التكرار

مثل هذه البيانات بالأعمدة [٣]



أحمد بن علي

(٥) الجدول التالي يبيّن درجات ٤٨ تلميذاً

المجموع	- ٠.	- ٤٠	- ٣٠	- ٢٠	- ١٠	المجموعات
٤٨	١٢	٨	١٠	....	٦	التكرار

[١] أكمل الجدول


[٢] عدد التلاميذ الحاصلين على أقل من ٣٠ درجة

= .... تلميذ

[٣] عدد التلاميذ الحاصلين على ٣٠ درجة فأكثر

= .... تلميذ


[٤] مثل هذه البيانات بالأعمدة



أحمد الشننو

المجموعات	- ٣	- ٠	المجموع
التكرار			

[٣] مثل هذه البيانات بالأعمدة



المجموعات

(٤) الجدول التالي يبيّن درجات الحرارة المسجلة في ٤٠ مدينة في أحد الأيام

المجموعات	- ٢٨	- ٢٦	- ٢٤	- ٢٢	- ٢٠	المجموع
النكرار	٤	٧	....	١٢	٨	٤٠

[١] أكمل الجدول

[٢] عدد المدن التي تقل درجة الحرارة فيها عن ٢٤ درجة مئوية

= .... مدينة

[٣] عدد المدن التي درجة الحرارة فيها ٢٦ درجة مئوية فأكثر

= .... مدينة

أحمد الشننو

أحمد الشننو

المدرسة	عدد التلاميذ
الحرية	٧ تلميذ
الكرامة	٦ تلميذ
العزّة	٣ تلميذ
النصر	٢ تلميذ
١٠٠ تلميذ	١ تلميذ

- [١] يوضح الرسم البياني المصور المقابل عدد التلاميذ في ٤ مدارس بإحدى المحافظات في عام دراسي من الرسم أكمل :
- [٢] الفرق بين عدد تلاميذ مدرستي الحرية و العزة = .... - .... = .... تلميذ

[٣] مجموع تلاميذ مدرستي الكرامة و النصر

= .... - .... = .... تلميذ

- [٤] يوضح الرسم البياني المصور التالي عدد الأطفال الذين ولدوا على يد إحدى الطبيبات من الرسم أكمل :

السنة	عدد الأطفال
٢٠١٥	٣ تلميذ
٢٠١٤	٤ تلميذ
٢٠١٣	٣ تلميذ
٢٠١٢	٢ تلميذ
٢٠١١	١ تلميذ
٢٠١٠	٠ تلميذ

[٥] عدد المواليد في عام ٢٠١٣ = .... مولود

[٦] الفرق بين عدد مواليد عام ٢٠١١ و مواليد عام ٢٠١٥

= .... - .... = .... تلميذ

### الدرس الثالث : قراءة الجداول و الرسوم البيانية

نعلم كيفية تكوين الجداول التكرارية ( البسيطة و ذى المجموعات ) و تنظيم البيانات و عرضها بالأعمدة و الأعمدة المزدوجة و بالصور حيث : فى الرسم البياني المصور نستخدم الرسوم لعرض المعلومات و كل الرموز لها نفس القيمة و لتحديد مقياس شئ ما فى رسم بياني مصوري نضرب عدد الرموز فى قيمة الرمز

مثال :

الرسم البياني المصور المقابل يمثل عن عدد التلاميذ بكل صف بإحدى المدارس الإبتدائية فى عام دراسي :

[١] عدد تلاميذ الصف الرابع

[٢] الفرق بين عدد تلاميذ الصفين السادس و الثالث


الصف	عدد التلاميذ
السادس	٤ تلميذ
الخامس	٣ تلميذ
الرابع	٣ تلميذ
الثالث	٢ تلميذ
الثاني	٤ تلميذ
الأول	٣ تلميذ
الحادي	٠ تلميذ

[١] عدد تلاميذ الصف الرابع =  $٣ \times ٣ = ٩$  تلميذ

[٢] الفرق بين عدد تلاميذ الصفين السادس و الثالث

=  $٤ - ٣ = ١$  تلميذ


- (٤) يبيّن الرسم البياني بالأعمدة التالى عدد المتعلمين المشتركين فى الألعاب الرياضية مختلفة بمدرستين أكمل :



- [١] عدد المشتركين فى كرة القدم من المدرستين = .... مشترك
- [٢] الفرق بين المشتركين فى كرة السلة من المدرستين = .... مشترك
- [٣] يتساوى عدد المشتركين فى المدرستين لعبه ....
- [٤] المدرسة التي يشترك عدد أكبر من المتعلمين فى الألعاب الرياضية هي المدرسة ....

أحمد الشنتوري

- (٣) يبيّن الرسم البياني بالأعمدة التالى عدد القصص التي قرأها ستة تلاميذ خلال عام من الرسم أكمل :




- [١] ..... قرأ أكثر عدد من القصص
- [٢] ..... قرأ أقل عدد من القصص
- [٣] ..... ، ..... مجموع ما قرأ = ٩ قصص
- [٤] ..... ، ..... مجموع ما قرأ = ١٠ قصص
- [٥] ..... قرأ عدد من القصص أكثر من محسن
- [٦] ..... قرأ عدد من القصص أقل من سوسن
- [٧] عدد القصص التي قرأها التلاميذ جمِيعاً .....

أحمد الشنتوري

(١) الجدول التالي يوضح تبرع مجموعة من التلاميذ بمبالغ مالية بالجنيه في يوم اليتيم :

المجموع	- ١٢	- ١٠	- ٨	- ٦	- ٤	- ٢	مبلغ التبرع
النكرار	٩	١٧	٢٤	٣٠	١٥	٠	

- [١] عدد التلاميذ الذين تبرعوا بمبلغ ٨ جنيهات فأكثر = .... تلميذ  
[٢] عدد التلاميذ الذين تبرعوا بمبلغ أقل من ١٠ جنيهات = .... تلميذ  
[٣] أرسم المدرج التكراري لهذا التوزيع




## الدرس الرابع : تمثيل البيانات بالدرج التكراري و المضلعل التكراري

**أولاً : المدرج التكراري :**  
لتمثيل بيانات جدول تكراري ذي مجموعات بالمدرج التكراري  
**نتبع ما يلى :**

- (١) نرسم المحورين الأفقي و الرأسى
  - (٢) نقسم كل من المحورين إلى أقسام متساوية مناسبة لبيانات الجدول
  - (٣) نرسم مستطيلات بحيث تكون فئات المدرج التكرارى متساوية

**مثال :** الجدول التالي يبين درجات ٥٠ تلميذاً في أحد الامتحانات  
رسم المدرج التكراري الذي يمثل هذه البيانات

المجموعات	- ٥٠	- ٤٠	- ٣٠	- ٢٠	- ١٠	المجموع
٥٠	٨	١٢	١٤	٦	٧	النكرار



## الطريقة الثانية :

و خطواتها كما يلى :

- (١) نرسم المحورين الأفقي و الرأسى و نقسمهما إلى أقسام متساوية مناسبة للتوزيع المعطى
- (٢) نعين مركز كل مجموعة حيث :

$$\text{مركز المجموعة} = \frac{\text{بداية المجموعة} + \text{نهايتها}}{٢}$$

$$\text{فمثلاً : مركز المجموعة الأولى} = \frac{٢٠ + ١٠}{٢} = ١٥$$

$$\text{مركز المجموعة الثانية} = \frac{٣٠ + ٢٠}{٢} = ٢٥ \quad \text{وهكذا}$$

- (٣) نعين النقط التي تمثل الأزواج المرتبة ( مركز المجموعة ، التكرار ) كما بالجدول التالي :

النقطة التي تمثل المجموعة	النكرار	المجموعات	مركز المجموعة	المجموعات
(٦ ، ١٠)	٦	١٠	-١٠	
(١ ، ٢٥)	١٠	٢٥	-٢٥	
(١٤ ، ٣٥)	١٤	٣٥	-٣٥	
(١٢ ، ٤٥)	١٢	٤٥	-٤٥	
(٨ ، ٥٥)	٨	٥٥	-٥٥	

## ثانياً : المضلع التكراري :

لتمثيل بيانات جدول تكراري ذي مجموعات بالمضلع التكراري

نتبع إحدى الطريقتين كما بالمثال التالي :

مثال : ارسم المضلع التكراري للتوزيع التكراري :

المجموعات	٠٠ -	٢٠ -	٣٠ -	٤٠ -	٥٠ -	٦٠ -	٧٠ -
التكرار	٦	١٠	١٤	١٦	١٢	٨	٦

## الطريقة الأولى :

و خطواتها كما يلى :

- (١) نرسم المدرج التكراري كما سبق

- (٢) ننصف القواعد العليا للمستطيلات المكونة للمدرج


- (٣) نرسم قطعاً مستقيمة تصل بين نقط التنصيف

- (٤) المضلع المكون من إتحاد هذه القطع المستقيمة على التوالي


يسمي المضلع التكراري

و هو باللون الأخضر

كما بالشكل التالي





(٤) نرسم باستخدام المسطرة و القلم الرصاص قطعاً مستقيمة تصل بين هذه نقط على التوالي فنحصل على المضلع التكراري كما بالشكل التالي



[١] المدرج التكراري

[٢] المضلع التكراري



أحمد الشنيري

(٥) الجدول التالي يبيّن ساعات عمل ٥ عاملًا

المجموعات	المجموع	التكرار
٠ - ٤	١٢	٥
٤ - ٨	١٦	٤
٨ - ١٢	١٣	٣
١٢ - ١٦	١٧	٢
١٦ - ٢٠	١٩	١
٢٠ - ٢٤	٢١	٠

[١] أرسم المدرج التكراري لهذا التوزيع



[٢] أرسم المضلع التكراري لهذا التوزيع

أحمد الشنيري

أحمد الشنيري

(٣) ارسم المضلع التكرارى للتوزيع التالى

المجموعات	-٥٠	-٢٠	-١٠	-١٠	-٥	المجموع
التكرار	٤	٦	١١	٩	٠	٣٥



(١) أوجد قيمة س

(٢) عدد الزوار الذين أعمارهم عن ٤٠ عاماً فأكثر = .... زائر

(٣) عدد الزوار الذين تقل أعمارهم عن ٣٠ عاماً = .... زائر


(٤) ارسم المضلع التكرارى لهذا التوزيع

أحمد الشننو

(٤) الجدول التالى يوضح أعمار زوار أحد معرض الكتاب خلال ساعة من النهار :

المجموعات	-٥٠	-٤٠	-٣٠	-٢٠	-١٠	المجموع
التكرار	٨	١٠	١٢	٦	٣	٤٥

(٢) اكتب عدد القطاعات الدائرية في كل شكل من الأشكال التالية :



مثال :

قم أحد التلاميذ بـاستطلاع رأى ١٢٠ تلميذاً لمعرفة اللعبة الرياضية التي يفضلونها فوجد التالي :

٣. تلميذاً يفضلون لعب كرة السلة ،

٦. تلميذاً يفضلون لعب كرة القدم ،

١٠. تلميذاً يفضلون لعب كرة اليد ،

١٠. تلميذاً يفضلون لعب كرة المضرب

مثل البيانات السابقة بالقطاعات الدائرية

الحل

$$\frac{٣}{١٢٠} = \frac{١}{٤} \quad \text{أى أن : } \frac{١}{٤} \text{ الدائرة يمثل التلاميذ الذين يفضلون لعب كرة السلة}$$

$$\frac{٦}{١٢٠} = \frac{١}{٢} \quad \text{أى أن : } \frac{١}{٢} \text{ الدائرة يمثل التلاميذ الذين يفضلون لعب كرة القدم}$$

## الدرس الخامس : تمثيل البيانات بالقطاعات الدائرية

تمهيد :

في الشكل المقابل :

دائرة مركزها م أنصاف أقطارها ٣ ، ٣ ب

ـ ح تقسّم سطح الدائرة إلى ثلاثة أجزاء


مساوية يسمى كل منها :

قطاعاً دائرياً


(نصف قطر الدائرة هو القطعة المستقيمة

الواصلة بين مركز الدائرة ونقطة على الدائرة )


(١) اكتب الكسر الذي يمثله الجزء المظلل من الرسم في كل ما يلى :




[٣]




[٢]



[١]



[٥]




[٤]


(٤) الجدول التالي يوضح أعداد التلاميذ المشتركين في الأنشطة المدرسية :

المجموع	الاجتماعي	الفنى	الرياضي	النشاط
٢٤٠	٤٠	٨٠	١٢٠	عدد التلاميذ

أكمل ما يلى ثم مثل البيانات السابقة بالقطاعات الدائرية التالية



- [١] النشاط الرياضى يمثل .... دائرة
- [٢] النشاط الفنى يمثل .... دائرة
- [٣] النشاط الاجتماعى يمثل .... دائرة



(٥) الشكل المقابل يمثل عدد التلاميذ بإحدى المدارس فإذا كان عدد التلاميذ ٧٢٠ تلميذ و الجزء المظلل يمثل عدد البنات أكمل :

- [١] عدد البنات يمثل .... دائرة
- [٢] عدد الأولاد يمثل .... دائرة
- [٣] عدد البنات =  $720 \times \dots = \dots$  بنتاً
- [٤] عدد الأولاد =  $720 \times \dots = \dots$  ولداً


$\frac{15}{16} = \frac{1}{8}$  أي أن :  $\frac{1}{8}$  دائرة يمثل التلاميذ الذين يفضلون

لعبة كرة اليد

$\frac{15}{16} = \frac{1}{8}$  أي أن :  $\frac{1}{8}$  دائرة يمثل التلاميذ الذين يفضلون

لعبة كرة المضرب

الشكل المقابل يمثل البيانات السابقة بالقطاعات الدائرية




(٦) يصرف موظف راتبه الشهري على النحو التالي :

١٠٠ جنيه شراء طعام ، ٥٠.. جنيه شراء ملابس ،

٢٥.. جنيه إيجار شقة ، ٢٥.. جنيه مصاريف أخرى

أكمل ما يلى ثم مثل البيانات السابقة بالقطاعات الدائرية التالية

- [١] إجمالي راتب الموظف = .... جنيه
- [٢] شراء الطعام يمثل .... دائرة
- [٣] شراء الملابس يمثل .... دائرة
- [٤] إيجار الشقة يمثل .... دائرة
- [٥] المصاريف الأخرى تمثل .... دائرة



(٦) يوضح التمثيل البياني بالقطاعات الدائريه عدد ساعات إستذكار سمير لكل مادة من المواد الدراسية التي يدرسها خلال الأسبوع الماضي : أكمل :



(٧) باع了一 من المكتبات ... كتاب من الكتب العلمية فإذا كان عدد الكتب المباعة من مادة العلوم ١٢ كتاب و يمثلها اللون الأسود ، و عدد الكتب المباعة من اللغة الإنجليزية ١٧. كتاب و يمثلها اللون الأصفر ، و عدد الكتب المباعة من الدراسات الاجتماعية ١٠. كتاب و يمثلها اللون الأخضر ، عدد الكتب المباعة من مادة الرياضيات ممثلة باللون الأحمر ، و عدد الكتب المباعة من مادة اللغة العربية ممثلة باللون الأزرق : أكمل :

[١] مجموع عدد الكتب المباعة من مادة الرياضيات و مادة العلوم = .... كتاب

[٢] مجموع عدد الكتب المباعة من مادة اللغة الإنجليزية و مادة الدراسات الاجتماعية و مادة اللغة العربية = .... كتاب

[٣] عدد الكتب المباعة من مادة الرياضيات = .... كتاب

[٤] عدد الكتب المباعة من مادة اللغة العربية = .... كتاب

- [١] المادة التي لها أكبر عدد من ساعات الإستذكار هي ....
- [٢] المادة التي لها أقل عدد من ساعات الإستذكار هي ....
- [٣] المادة التي لها ثلاثة أضعاف ساعات إستذكار التربية الدينية هي ....
- [٤] الفرق بين عدد ساعات إستذكار اللغة الإنجليزية و عدد ساعات إستذكار اللغة العربية = .... ساعة
- [٥] مجموع عدد الساعات التي استغرقها سمير في الإستذكار الأسبوع الماضي = .... ساعة

## الدرس الثالث : ترتيب و مقارنة الأعداد الطبيعية

(١) مثل بنفسك

$$\{ 0, 2 \} = س \cap ص$$

$$\{ 0, 4, 3, 2, 1 \} = س \cup ص$$

$$\{ 3, 1 \} = س - ص = ص - س = \{ 4, 0 \}$$

(٢)  $ه < م$  لأن :  $ه$  تقع على يسار  $م$ (٣)  $ه > م$  لأن :  $ه$  تقع على يسار  $م$ (٤)  $ب > e$  لأن :  $ب$  تقع على يمين  $e$ (٥)  $م > ه$  لأن :  $m$  تقع على يمين  $ه$ (٦) الترتيب التصاعدي لهذه الأعداد هو :  $m, b, e, h$ 

$$\{ 0, 4, 3, 2, 1, 0 \} = س = [١]$$

$$\{ ..., 0, 4, 3 \} = ص = [٢]$$

$$\{ 6, 0, 4, 3, 2 \} = ع = [٣]$$

$$\{ 7, 6, 0, 4, 3, 2 \} = ل = [٤]$$

$$= [٦] > [٥] < [٣] < [٢] > [١] (٠)$$

(٧) مثل بنفسك ، الترتيب التصاعدي :  $س، ص، ع، ل$ 

$$\{ 4, 3, 2, 1 \} = [١] \quad \{ ..., 6, 0, 4 \} = [٥]$$

$$\{ 6, 0, 4, 3, 2 \} = [٤] \quad \{ 7, 6, 0, 4 \} = [٣]$$

$$\wedge [٨] \quad \wedge [٧] \quad \wedge [٥] \quad \{ ..., 6, 0, 4 \} = [٥]$$

$$\wedge \geqslant ل > ع [٣] \quad ل \leqslant ع [٢] \quad س > ص [١] (٨)$$

$$9 \geqslant ل \geqslant ع [٤]$$

## اجوبة بعض التمارين

## الأعداد الطبيعية

## الدرس الأول : مجموعة الأعداد الطبيعية

$$\supset [٨] \supset [٧] \ni [٦] \supset [٥] \not\supset [٤] \not\supset [٣] \not\supset [٢] \ni [١] (٠)$$

$$\text{صفر } [١] \ni [٣] \ni [٥] \ni [٤] \ni [٢] \ni [٠] \{ 0, 4, 3, 2, 1, 0 \} \subset ط$$

## الدرس الثاني : بعض المجموعات الجزئية من ط

$$\{ ٢ \} \subset [٣] \subset [٤] \subset [٥] \subset [٦] \subset [٧] \subset [٨] \subset [٩] \subset [١٣] \subset ... (٠)$$

$$\{ ٨, ٦, ٤, ٢, ٠ \} \subset [٥]$$

$$\{ ٢٣, ١٩, ١٧, ١٣, ١١, ٧, ٥ \} \subset [٧]$$

$$[٣] \subset [٤] \subset [٥] \subset [٦] \subset [٧] \subset [٨] \subset [٩] \subset [١٣] \subset [١] (٣)$$

$$\{ ١٣, ١١, ٩, ٧, ٥, ٣, ١ \} \subset [١] (٣)$$

$$\{ ..., ١٠, ١٢, ١٤, ١٦ \} \subset [١]$$

$$\{ ١٩, ١٧, ١٣, ١١, ٧, ٥, ٣ \} \subset [٣]$$

$$\{ ١٣, ١١, ٩, ٧, ٥, ٣ \} \subset [٤]$$

$$ع [٤] \subset [٦] \subset س \subset [٧] \subset \emptyset [٥]$$

$$\{ ٢ \} = \{ ..., ٥, ٣, ٢ \} \cap \{ ٢ \} \subset [١] (٢)$$

$$\{ ٠ \} = \{ ..., ٤, ٢, ٠ \} \cap \{ ٠ \} \subset [١]$$

$$\{ ١ \} = \{ ..., ٥, ٣, ١ \} \cap \{ ٦, ٣, ٢, ١ \} \subset [٣]$$

$$\{ ٤, ٢, ١ \} = \{ ..., ٥, ٣, ٢ \} - \{ ٤, ٢, ١ \} \subset [٤]$$

$$ط - ف = ز [٦] ط - ط = ط [٧] ط - ط = ط [٥]$$



$$\text{غير ممكنة} = \gamma \div \Gamma \quad , \quad \exists = \Gamma \div \gamma \quad [1] (4)$$

## الاستنتاج : عملية القسمة غير ابدالية في ط

$$\Gamma = \Gamma \div \Sigma = (\Gamma \div \Sigma) \div \Sigma \quad [\Gamma]$$

$$\frac{F}{E} = \Gamma \div \gamma = \Gamma \div (\Sigma \div \Gamma \Sigma)$$

## الاستنتاج : عملية القسمة غير دامجة في ط

١) زوجي ٢) فردي ٣) زوجي ٤) زوجي ٥) زوجياً

فردياً [fər'di:ə] زوجياً [zuh'ji:ə] معاً [muh'uh] في [fɪ:uh]

$\mu_1 + \mu_2 + \mu_3 = 0$

(١٣) قلم ۱۷: ۳، ۱۸: ۱، ۱۹: ۲، ۲۰: ۱، ۲۱: ۱، ۲۲: ۱

(٤) أحب نفسك ، الاحياء هم :

0V-0V: [ə] ΓΣ0- [ξ] Αρ.. [ι] Σ... [η] ΒΓΓ [γ]

$$\therefore \mathbf{E}_0 = \mathbf{B} = \mathbf{B}_0, \quad \mathbf{V}_0 = \mathbf{B}_0 \times \mathbf{V}_0$$

$$\mathbf{F}_c = \rho \times \mathbf{J} = \rho \times (\mathbf{E} \times \mathbf{B}), \quad \mathbf{J} = \nabla \times \mathbf{A}$$

الناتج الناتج التصاعدي هو :  $178 = 3 \times 58 + 8$

$$1 \times \mathbf{v} \rightarrow \mathbf{v} = \mathbf{e}_0$$

## الدرس الخامس : الأنماط العددية

ξο ; οο [Ξ] ηη ; ιι [Η] εε ; ζζ [Ε]

۳۳۳۳۳۳۳۳ ۳ ، ۳۳۳۳۳ ۳ [ə] ۳ ۳ ، ۳ [ɛ]

$1 \times 1, 0 \times 0$  [V] 11 : 11 [7]

١.	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	الأعوام
١٢٥	١١٥	١٠٥	٩٥	٨٥	٧٥	٦٥	٥٥	٤٥	٣٥	قيمة الاشتراك

Scanned by 102

أجب بنفسك

الدرس الأول : التعبيرات الرياضية

Scanned by 102

أجب بنفسك

وحدة الثانية

1000 JOURNAL OF CLIMATE

٤٦

6

v.

## الدرس الثالث : المعادلات

التعبير الرمزي	التعبير الرمزي	(١)
$s + 3 = 10$	عدد إذا أضيف إليه ٣ ينتج ١٠	[١]
$s - 6 = 11$	عدد إذا طرح منه ٦ ينتج ١١	[٢]
$s + 1 = 0$	عدد إذا أضيف إليه ١ ينتج ٠	[٣]
$2s + 4 = 12$	ضعف عدد مضافاً إليه ٣ يساوى ٤	[٤]
$2s - 9 = 33$	ضعف عدد مطروحاً منه ٩ يساوى ٣٣	[٥]
$3s = 0$	ثلاثة أمثال مضافاً إليه ٥ يساوى ١٢	[٦]

$$(٣) s - 0 = 9$$

(٤) فصل به ٣٢ طالباً تغيب منهم س فكان عدد الحضور ٢٧

(٥) العدد الذي يضاف إلى ٥ لينتاج ١٥ هو ١٠

و ذلك لأن :  $10 = 0 + 10$  إذن :  $s = 10$

(٦) فإن :  $s - 0 = 0 + 0$  إذن :  $s = 0$

(٧) فإن :  $s + 3 = 3 - 3$  إذن :  $s = 0$

(٨)  $s + 1 - 1 = 1 - 1$

إذن مجموعة الحل = {٨}

(٩)  $s - 1 + 1 = 1 + 1$

إذن مجموعة الحل = {١٠}

(١٠)  $4s - 3 + 3 = 3 + 13$  إذن :  $4s = 16$

بالقسمة على ٤ إذن :  $s = 4$  ، مجموعة الحل = {٤}

(١) [١] ٢٠ - ٣ [٢] ثلاثة أمثال العدد س مضافاً إليه ١

[٣] [٤] نصف العدد س مضافاً إليه ٦

[٥] [٦]  $\frac{1}{2}s - 4 = 7$  [٧] [٨]  $s - 9 = 5$

[٩] أربعة أمثال العدد س مطروحاً من ٢٤

(١) [١]  $s + 7 = 6 - 3$  [٣] [٤]  $s - 3 = 8$  [٥]

(٢) [١]  $2s - 2 = 3s + 5$  [٣] [٤]  $s + 3 = 10$  - س سم

[٥] [٦]  $2s + 2 = 5s - 5$  [٧] [٨]  $s = 5$

## الدرس الثاني : المتغير و الثابت

(١) ثابت [٢] ثابت [٣] متغير

(٢) [٤] ل [٥] ل [٦] س [٧] [٨] س - س

[٩] [١]  $2s + 9 = 4l + 2$  [٣] [٤]  $s + 3 = l$

(٣) [١] [٣]  $30 = 10 \times 3$  جنيهاً

(٤) ما دفعه مدحت =  $28s + 0$  جنيهاً

القيمة العددية عندما	العلاقة	(١)
$s = 4$	$s = 3$	
١١	١٠	[١]
٢	١	[٢]
٨	٩	[٣]
١٢	٩	[٤]
	٣س	

[٩] بالقسمة على ٩ ينتج :  $s = ٦$   
 إذن : مجموعه الحل = {٦}  
 $(١٠ + ٧) \times ٧ = ١٩ \times ٧$  [١]

بما أن :  $٧ \times ٧ = ١٩ \times (١٠ + ٩)$  خاصية التوزيع  
 إذن :  $s = ٩$  ، مجموعه الحل = {٩}

$s \times ٦ + s \times ٩ = ٤٢ \times ٩$  [٣]

بما أن :  $٩ \times ٩ = ٤٢ \times (٦ + ٣٦)$  خاصية التوزيع  
 إذن :  $٣٦ \times ٩ + ٦ \times ٩ = ٤٢ \times ٩$

و يكون :  $s \times ٦ + s \times ٩ = ٣٦ \times ٩ + ٦ \times ٩ = ٣٦ \times ٩$   
 أي أن :  $s = ٩$  إذن : مجموعه الحل = {٩}

$٨ \times ٤٠ = s (١٠ + ٣٥)$  [٤]

بما أن :  $٨ \times ٤٠ = ٤٠ \times (١٠ + ٣٥)$  خاصية التوزيع  
 إذن :  $٨ \times ٨ = (١٠ + ٣٥) \times ٨$  = مجموعه الحل = {٨}

أي أن :  $s = ٨$  إذن : مجموعه الحل = {٨}

$s = ٥٧٣$  [٥]

خاصية الدمج  $(٠٠ + ٧٠) + (١٠ \times ٧) = ٥٧٣$

أي أن :  $s = ٥٧٣$

إذن :  $٥٧٣ - ٥٧٠ = ٥٧٠ - s$  = مجموعه الحل = {٣}

أي أن :  $s = ٣$  إذن : مجموعه الحل = {٣}

$٤٨٣ = (٣ + ٤) \times (١٠ + s)$  [٦]

خاصية الدمج  $٤٨٣ = ٨ \times s + ٤٠٠$

[٤]  $٥s + ٤٠ = ٨ - ٨ - ١٣$  إذن :  $s = ٥$   
 بالقسمة على ٥ إذن :  $s = ١$  ، مجموعه الحل = {١}

[٥]  $٧ - s = ٦$  نبحث عن العدد إذا طرحناه من ٧ يكون  
 الناتج ٦ " نجد أنه ١ " لأن :  $٧ - ٦ = ١$   
 أي أن :  $s = ٧ - ١$  إذن :  $s = ٦$   
 و هو حل المعادلة إذن مجموعه الحل = {٦}

[٦]  $١٨ - ل = ٨$  نبحث عن العدد إذا طرحناه من ١٨ يكون  
 الناتج ٨ " نجد أنه ١٠ " لأن :  $١٨ - ٨ = ١٠$   
 أي أن :  $١٨ - ل = ١٠$  إذن :  $l = ١٠$   
 و هو حل المعادلة إذن مجموعه الحل = {١٠}

$\frac{s}{٣} = ٣$  بالضرب × ٣ ينتج :  $s = ٩$  [٧]  
 إذن : مجموعه الحل = {٩}

[٨]  $٥٠ = ١٠٠$  بالقسمة على ٥ ينتج :  $s = ٢٢$   
 إذن : مجموعه الحل = {٢٢}

$\frac{١}{٣}s - ٣ = ٣ + ٣$  [٩]  
 $\frac{١}{٣}s = ٦$  بالضرب × ٣ ينتج :  $s = ١٨$   
 إذن : مجموعه الحل = {١٨}

$\frac{١}{٧}s - ١٠ = ٧ - ٧ + ٧$  [١٠]  
 $\frac{١}{٧}s = ٣$  بالضرب × ٧ ينتج :  $s = ٢١$   
 إذن : مجموعه الحل = {٢١}

$$\text{إذن : } \Delta \text{ مساحة} = \frac{1}{2} \times 8 \times 3 = 12 \text{ سم}^2$$

$$\text{إذن : } \Delta \text{ مساحة} = \frac{1}{2} \times 9 \times 4 = 18 \text{ سم}^2$$

$$\text{إذن : } \Delta \text{ مساحة المستطيل} = 10 \times 6 = 60 \text{ سم}^2$$

$$\text{إذن : } 60 = 6 \times 10$$

و منها :  $6 = 0$  سم ، وبما أن :  $b = h = 6$  سم

$$\text{إذن : } h = 6 = 10 - 4 = 6 \text{ سم}$$

$$\text{إذن : } \Delta \text{ مساحة} = \frac{1}{2} \times 6 \times 6 = 18 \text{ سم}^2$$

$$\text{إذن : } \Delta \text{ محيط المربع} = 4 \times \text{طول الضلع}$$

$$\text{إذن : } 4 \times 6 = 24 \text{ سم}$$

$$\text{و منها : } 24 = 6 + 6 + 6 + 6 = 24 \text{ سم}$$

$$\text{وبما أن : } b = h = 6 \text{ سم}$$

$$\text{إذن : } h = 6 = 24 - 18 = 6 \text{ سم}$$

$$\text{إذن : } \Delta \text{ مساحة} = \frac{1}{2} \times 10 \times 6 = 30 \text{ سم}^2$$

$$\text{و مساحة المربع} = 10 \times 10 = 100 \text{ سم}^2$$

$$\text{إذن : } \Delta \text{ مساحة الشكل} = 100 + 100 = 200 \text{ سم}^2$$

$$\text{إذن : } \Delta \text{ مساحة} = \frac{1}{2} \times b \times h = \frac{1}{2} \times 6 \times 6 = 18 \text{ سم}^2$$

$$\text{إذن : } \Delta \text{ مساحة} = 18 \times 2 = 36 \text{ سم}^2$$

$$\text{إذن : } \Delta \text{ مساحة} = \frac{1}{2} \times b \times h = \frac{1}{2} \times 6 \times 6 = 18 \text{ سم}^2$$

$$\text{إذن أن : } 483 = 8 + 403$$

$$\text{إذن : } 483 - 403 = 8 + 403 - 403$$

$$\text{إذن : } 8 = 8 \text{ ، بالقسمة على 8}$$

$$\text{إذن : } 10 = 8 \text{ ، مجموعة الحل} = \{10\}$$

$$\text{إذن : } 6 [I] 9 [II] 11 [III] 17 [IV] 3 [V] 77 [VI] 0 [VII] 1 [VIII]$$

$$\text{إذن : } 6 [I] 9 [II] 4 [III] 2 [IV] 0 [V] 3 [VI] 1 [VII]$$

## الوحدة الثالثة

## القياس

## الدرس الأول : المساحة و وحداتها

$$\text{إذن : } \Delta \text{ مساحة المثلث} = \frac{1}{2} \times 6 \times 8 = 24 \text{ سم}^2$$

$$\text{إذن : } \Delta \text{ مساحة المثلث} = \frac{1}{2} \times 10 \times 4 = 20 \text{ سم}^2$$

$$\text{إذن : } \Delta \text{ مساحة المثلث} = \frac{1}{2} \times 6 \times 3 = 9 \text{ سم}^2$$

طول قاعدة المثلث بالسنتيمترات	ارتفاع المثلث بالسنتيمترات	مساحة المثلث بالسنتيمترات المربعة
٨	٧	٥٦
١٠	٦	٣٠
٦	٩	٢٧
١٤	٠	٣٠
٧,٥	٦,٨	٥٠,٠

$$\text{مساحة المربع} = \text{ب} \times \text{ص} = 3 \times 3 = 9 \text{ سم}^2$$

$$\text{مساحة المربع} = \text{ب} \times \text{ح} = 4 \times 4 = 16 \text{ سم}^2$$

$$\text{مساحة المربع} = \text{ب} \times \text{ب} = 0 \times 0 = 0 \text{ سم}^2$$

$$\text{مساحة المربع} = \text{ب} \times \text{ب} = \text{مساحة المربع} = \text{ب} \times \text{ح}$$

$$\text{مساحة المربع} = \text{ب} \times \text{ص}$$

$$(٦) \text{ مجموع الضلعين المعلومين} = 8 + 6 = 14 \text{ سم}$$

$$\text{طول الضلع الثالث} = 24 - 14 = 10 \text{ سم}$$

$$\text{مساحة المثلث} = \frac{1}{2} \times 10 \times 4,8 = 24 \text{ سم}^2$$

$$> [٦] = [٥] < [٤] < [٣] < [٢] < [١] < [٠]$$

## الدرس الثاني : مساحة متوازي الأضلاع

(٧)

مساحة متوازي الأضلاع بالسنتيمترات المربعة	ارتفاع متوازي الأضلاع بالسنتيمترات	طول قاعدة متوازي الأضلاع بالسنتيمترات
٦	٧	٨
٣٠	٣	١٠
٢٧	٩	٣
٧٠	٠	١٤
٢٥٠	٧٠	٣٤

$$\text{مساحة متوازي الأضلاع} = 3 \times 7 = 21 \text{ سم}^2$$

$$\text{مساحة متوازي الأضلاع} = 4 \times 6 = 24 \text{ سم}^2$$

$$\text{إذن : } ٨٠ = \frac{١}{٢} \times ١٦ \times \text{ب} \times \text{ه}$$

$$\text{و منها : } \text{ب} \times \text{ه} = \frac{٨٠ \times ٢}{١٦} = ١٠ \text{ سم}$$

$$(٨) \text{ مساحة المستطيل} = \text{ب} \times \text{ح} = ٤ \times ٨ = ٣٢ \text{ سم}^2$$

$$\text{ب} \times \text{ه} = \text{ب} \times \text{ح} - \text{ح} \times \text{ه} = ١٠ - ٨ = ٢ \text{ سم}$$

$$\text{مساحة } \Delta = \frac{١}{٢} \times \text{ب} \times \text{ه} \times \text{ب}$$

$$= \frac{١}{٢} \times ٤ \times ٣ = ٦ \text{ سم}^2$$

$$\text{مساحة الشكل} = \text{مساحة المستطيل} - \text{مساحة } \Delta = ٣٢ - ٦ = ٢٦ \text{ سم}^2$$

$$\text{مساحة } \Delta = ٦ - ٣٢ = ٢٦ \text{ سم}^2$$

$$(٩) \text{ مساحة المربع} = \text{ب} \times \text{ح} = ٨ \times ٨ = ٦٤ \text{ سم}^2$$

$$\text{ب} \times \text{ه} = \text{ب} \times \text{ب} = ٨ \times \frac{١}{٢} \times ٤ = ٤ \text{ سم}$$

$$\text{مساحة } \Delta = \frac{١}{٢} \times ٤ \times ٤ = ٨ \text{ سم}^2$$

$$\text{مساحة } \Delta = \frac{١}{٢} \times ٨ \times \frac{١}{٢} \times ٤ = ١٦ \text{ سم}^2$$

$$\text{مساحة } \Delta = \frac{١}{٢} \times ٨ \times \frac{١}{٢} \times ٨ = ٣٢ \text{ سم}^2$$

$$\text{مساحة } \Delta + \text{مساحة } \Delta = \text{مساحة متوازي الأضلاع} = ٦٤$$

$$= ٦٤ + ٦٤ + ٨ = ١٢٠ \text{ سم}^2$$

$$\text{مساحة } \Delta = ٦٤ - ٦٤ = ٤٠ \text{ سم}^2$$

$$(٩) \text{ مساحة } \Delta = \frac{١}{٢} \times ٤ \times ٣ = ٦ \text{ سم}^2$$

$$(٧) \text{ مساحة متوازي الأضلاع} = ١٢ \times ٦ = ٧٢ \text{ سم}^٢$$

$$\text{مساحة المثلث} = ٧٢ \text{ سم}^٢$$

$$\text{ارتفاع المثلث المناظر لهذه القاعدة} = \frac{٧٢}{٨} = ٩ \text{ سم}$$

$$= [٥] \quad ١٥ [٣] \quad ٢١ [٢] \quad ٢ [١] \quad (٧)$$

### الدرس الثالث : مساحة المربع بمعطى طول قطره

(١) أكمل لإيجاد مساحة مربع طول قطره ٦ سم

$$\text{مساحة المربع} = \frac{1}{2} \times \text{طول القطر} \times \text{طول القطر}$$

$$= ٦ \times \frac{٦}{٢} = ١٨ \text{ سم}^٢$$

$$(٢) \text{ ضعف مساحة المربع} = ٤٩$$

$$\text{طول قطر المربع} = ٧ \text{ سم} \quad \text{لأن} : ٤٩ = ٧ \times ٧$$

$$[٤] \quad ٣٦ [٣] \quad ٥ [٢] \quad ٠ [١] \quad (٣) \quad ٩ [٣] \quad ٤٩ [٤] \quad ٥ [٥] \quad ١٢١ [٦] \quad ١٠ [٧] \quad ٤٤ [٨]$$

$$٧٢ [٧] \quad ١٠ [٦] \quad ٥ [٣] \quad ٩ [٤] \quad ٢٤,٥ [٥] \quad ٦٠,٥ [٦] \quad ١٨ [١] \quad (٤)$$

$$(٥) \text{ بـ } ٨ \text{ سم} \quad \text{إذن} : \text{مساحة المربع} = \frac{١}{٢} \times \text{بـ } ٨ \times \text{بـ } ٨$$

$$= ٨ \times ٨ \times \frac{١}{٢} = ٣٢ \text{ سم}^٢$$

$$(٦) \text{ مساحة المربع الأول} = ١٠ \times ١٠ = ١٠٠ \text{ سم}^٢$$

$$\text{مساحة المربع الثاني} = \frac{١}{٢} \times ١٤ \times ١٤ = ٩٨ \text{ سم}^٢$$

إذن : مساحة المربع الأول أكبر من مساحة المربع الثاني

$$(٣) \text{ مساحة متوازي الأضلاع} = ٤٠ \times ٨ \text{ سم}^٢$$

$$(٣) \text{ مساحة متوازي الأضلاع} = ٦ \times ١٠ \text{ سم}^٢$$

$$= ٤٨ = ٨ \times ٦ \text{ سم}^٢$$

$$\text{مساحة متوازي الأضلاع} = \text{بـ } ٦ \times \text{بـ } ٨ = \text{بـ } ٦ \times \text{بـ } ٦ = ٤٨$$

$$\text{إذن} : \text{بـ } ٦ = \frac{٤٨}{٦} = ٤ \text{ سم}$$

$$(٤) \text{ طول القاعدة الكبيرة} = \frac{\text{مساحة متوازي الأضلاع}}{\text{ارتفاع الصغرى}} = \frac{٣٠}{٣} = ١٠ \text{ سم}$$

$$\text{نصف محيط متوازي الأضلاع} = ٤ \text{ سم}$$

$$\text{طول القاعدة الصغرى} = ٤ - ١٠ = ٤ \text{ سم}$$

$$\text{ارتفاع الأكبر} = \frac{\text{مساحة متوازي الأضلاع}}{\text{طول القاعدة الصغرى}} = \frac{٣٠}{٣} = ١٠ \text{ سم}$$

$$(٥) \text{ بـ } ١٠ \text{ سم} \quad \text{، بـ } ٨ \text{ سم} \quad \text{، بـ } ٥ \text{ سم}$$

$$\text{مساحة متوازي الأضلاع} = \text{بـ } ٨ \times \text{بـ } ١٠ = ٨٠ \text{ سم}^٢$$

$$\text{مساحة المثلث وـ } ٥ = \text{بـ } ٥ \times \text{بـ } ٥ \times \frac{١}{٢} = ٣٠ \text{ سم}^٢$$

$$\text{مساحة الشكل} = \text{بـ } ٨ \text{ } - \text{بـ } ٥ \text{ } = ٣٥ \text{ سم}^٢$$

$$(٦) \text{ مساحة متوازي الأضلاع} = ٥٠ \times ١٠ = ٥٠٠ \text{ سم}^٢$$

$$\text{مساحة المثلث} = \frac{١}{٢} \times ١٢ \times ٨ = ٤٨ \text{ سم}^٢$$

$$\text{مساحة متوازي الأضلاع أكبر من مساحة المثلث}$$

$$\text{الفرق بين مساحتيهما} = ٥٠ - ٤٨ = ٢ \text{ سم}^٢$$

## الدرس الرابع : مساحة المعين بمعلومية طول قطره

$$\text{١.٧} \quad ٧. [٥] \quad ٢٧. [٤] \quad ١٤. [٣] \quad ١. [٢] \quad ٢٧. [١] \quad ٠. [٠]$$

$$٣ \quad ٥ [٥] \quad ٢٨. [٤] \quad ٤ [٣] \quad ٥ [٢] \quad ٥٤. [١] \quad ٦ [٠]$$

(٣) معين طولاً قطره ٦ سم ، و طول ضلعه ٥ سم

أكمل لإيجاد مساحته إرتفاعه

$$\text{مساحة المعين} = \frac{١}{٢} \times \text{حاصل ضرب طولاً قطره}$$

$$= \frac{١}{٢} \times ٦ \times ٨ = ٢٤ \text{ سم}^٢$$

$$\text{، مساحة المعين} = \text{طول ضلعه} \times \text{الارتفاع}$$

$$= ٢٤ = ٥ \times \text{الارتفاع}$$

$$\text{و منها : إرتفاع المعين} = \frac{٤}{٥} = ٤,٨ \text{ سم}$$

$$(٤) \text{ محيط المعين} = \text{طول ضلعه} \times ٤$$

$$= ٤ = \text{طول ضلعه} \times ٤$$

$$\text{إذن : طول ضلع المعين} = ١٠ \text{ سم}$$

$$\text{مساحة المعين} = \frac{١}{٢} \times \text{حاصل ضرب طولاً قطره}$$

$$= \frac{١}{٢} \times ١٢ \times ١٦ = ٩٦ \text{ سم}^٢$$

$$\text{، مساحة المعين} = \text{طول ضلعه} \times \text{الارتفاع}$$

$$= ٩٦ = ١٠ \times \text{الارتفاع}$$

$$\text{و منها : إرتفاع المعين} = \frac{٩٦}{١٠} = ٩,٦ \text{ سم}$$

$$(٥) \text{ مساحة المربع} = \frac{١}{٢} \times ١٠ \times ٠٠ = ٠٠ \text{ سم}^٢$$

$$(٦) \text{ مساحة المربع} = \frac{١}{٢} \times ١٠ \times ٠٠ = ٠٠ \text{ سم}^٢$$

$$\text{مساحة المثلث} = \frac{١}{٢} \times ١٥ \times ٦ = ٤٥ \text{ سم}^٢$$

إذن : مساحة المثلث أكبر من مساحة المربع

$$(٧) \text{ مساحة المستطيل} = ٧٥ = ٧,٥ \text{ سم}^٢$$

$$\text{مساحة المربع} = \frac{١}{٢} \times ٨ \times ٨ = ٣٢ \text{ سم}^٢$$

$$\text{مساحة الجزء المظلل} = ٧٥ - ٣٢ = ٤٣ \text{ سم}^٢$$

$$(٨) < [٥] = [٤] ٦ [٣] ١٠ [٢] ٨ [١]$$

$$(٩) \text{ مساحة قطعة الأرض} = ١٣ \times ١٣ = ١٦٩ \text{ م}^٢$$

$$\text{مساحة الجزء المزروع} = \frac{١}{٢} \times ١٦ \times ١٦ = ١٢٨ \text{ م}^٢$$

$$\text{مساحة الجزء غير المزروع} = ١٦٩ - ١٢٨ = ٤١ \text{ م}^٢$$

$$(١٠) \text{ مساحة المربع} = \frac{١}{٢} \times ١٠ \times ٠٠ = ٠٠ \text{ سم}^٢$$

$$\text{مساحة متوازي الأضلاع} = \text{مساحة المربع} = ٠٠ \text{ سم}^٢$$

$$\text{ارتفاع متوازي الأضلاع} = \frac{٥}{٦} = ٥ \text{ سم}$$

$$(١١) \text{ مساحة المربع الواحد} = \frac{١}{٢} \times ٨ \times ٨ = ٣٢ \text{ سم}^٢$$

$$\text{مساحة المربعات} = ٣٢ \times ٨ = ٢٥٦ \text{ سم}^٢$$

$$\text{مساحة الجزء المتبقى من الورقة} = ٣١٢ - ٢٥٦ = ٥٦ \text{ سم}^٢$$

محيط قطعة الأرض الأولى (المرربع) = طول الضلع × ٤

$$= ٤ \times ٨ = ٣٢$$

$$> [٧] < [٦] = [٥] < [٩] > [٤] = [٣] [٦] [٩]$$

### الدرس الخامس : محيط الدائرة

$$١٤ ، ١٠ [١] [٠] ٣١,٤ [٣] [٣] ٢٢ ، ٣,٥ [٢] [٥]$$

$$[٤] ٦٢,٨ [٥] ٦٦ ، ١٠ [٤]$$

$$(١) \text{ إذن : طول القطر} = \frac{\pi}{2} \times ٨٨ = ٢٨ \text{ سم}$$

$$\text{إذن : طول نصف القطر} = ١٤ \text{ سم}$$

$$(٢) \text{ إذن : طول القطر} = ١٠٠ \text{ سم}$$

$$\text{إذن : محيط الدائرة} = ٣,١٤ \times ١٠٠ = ٣١٤ \text{ سم}$$

$$(٤) \text{ إذن : محيط الدائرة الأولى} = ٣,١٤ \times ٢٠ = ٦٢,٨ \text{ سم}$$

$$\text{، محيط الدائرة الثانية} = ٣,١٤ \times ٤٠ = ١٢٥,٦ \text{ سم}$$

$$\text{إذن : الفرق بين محيطي الدائرتين} = ٦٢,٨ - ١٢٥,٦ = ٦٢,٨ \text{ سم}$$

$$(٥) \text{ الدورة الكاملة} = \text{محيط عجلة الدرجة} = \pi \times \text{طول القطر}$$

$$= ٢٤٢ \times \frac{\pi}{7} = ٧٧ \text{ سم}$$

$$\text{المسافة التي تقطعها العجلة إذا درات ١٠٠ دورة} =$$

$$= ٢٤٢ \times ١٠٠ = ٢٤٢٠ \text{ سم}$$

$$(٦) \text{ عجلة دراجة طول نصف قطرها ١٤ سم أكمل لإيجاد المسافة التي تقطعها العجلة عند دورانها دورة كاملة و عدد الدورات التي تدورها}$$

مساحة المعيّن =  $\frac{1}{2} \times ٦ \times ٦ = ٤٨ \text{ سم}^٢$

إذن : مساحة المربع أكبر من مساحة المعيّن

$$(٧) \text{ مساحة متوازي الأضلاع} = ٦ \times ١٠ \text{ سم}^٢$$

مساحة المعيّن = مساحة متوازي الأضلاع = ٨٠ سـم

مساحة المعيّن =  $\frac{1}{2} \times ٦ \times ١٠ \times ٦ \times ٦ \text{ حاصل ضرب طولا قطره}$

$$= ٨٠ = \frac{1}{2} \times ٦ \times ٦ \times \text{طول القطر الآخر}$$

$$\text{إذن : طول القطر الآخر للمعيّن} = \frac{٦}{٦} = ٦ \text{ سم}$$

$$(٨) \text{ مساحة المعيّن} = \frac{1}{2} \times ٦ \times ١٠ \text{ سم}^٢$$

مساحة المستطيل = مساحة المعيّن = ٦٠ سـم

مساحة المستطيل = الطول × العرض

$$= ٦٠ = ٦ \times \text{عرض}$$

$$\text{إذن : عرض المستطيل} = \frac{٦}{٦} = ٦ \text{ سم}$$

$$\text{محيط المستطيل} = (\text{الطول} + \text{العرض}) \times ٢$$

$$= ٣٢ = ٢ \times (٦ + ١٠)$$

$$(٩) \text{ مساحة المعيّن} = \frac{1}{2} \times ٦ \times ٨ \times ٦ = ٦٤ \text{ سم}^٢$$

مساحة المربع = مساحة المعيّن = ٦٤ سـم

مساحة المربع = طول الضلع × نفسه

$$= ٦٤ = \text{طول الضلع} \times \text{نفسه}$$

$$\text{إذن : طول ضلع المربع} = ٨ \text{ سم}$$

## التحويلات الهندسية

## الوحدة الرابعة

## الدرس الأول : الأشكال المتماثلة و محور التماثل

(١) [١] . [٢] . [٣] . [٤] . [٥] . [٦] . [٧] . [٨] . [٩]

(٢) ارسم بنفسك ( لاحظ : يوجد محور رأسى و آخر أفقى )

(٣) [١] دوران [٢] انعكاس [٣] انتقال

[٤] انتقال [٥] دوران [٦] انعكاس

(٤) ارسم بنفسك ، صورة المربع  $\triangle ABC$  هي : المربع  $\triangle A'B'C'$   
بالانعكاس فى  $L$  ( لأن :  $A \in L$  )

[١]  $\triangle A'B'C'$  [٢]  $\triangle C'B'A'$  [٤]  $\triangle C'A'B'$



(٥) [١] الصورة  $\triangle ABC$

[١]  $\triangle BCA$

[٢]  $\triangle CAB$  =  $90^\circ$

[٣] الصورة هي  $\triangle CAB$

[٤] الصورة هي  $\triangle ABC$



(٦) [١] الصورة هي المستطيل

[١]  $\triangle ABC$

[٢] الصورة هي المستطيل

[١]  $\triangle CAB$

العجلة لقطع مسافة ١٤٠.٨ سم  $(\pi = \frac{22}{7})$

الدورة الكاملة = محيط عجلة الدراجة =  $\pi \times \text{طول القطر}$

$$= \frac{22}{7} \times 14 = 44 \text{ سم}$$

عدد الدورات التي تدورها العجلة لقطع مسافة ١٤٠.٨ سم =

$$140.8 \div 44 = 3.2 \text{ دورة}$$

(٧) محيط القطعة الأولى =  $7.0 \times \frac{22}{7} = 22.0$  متراً

تكلفة القطعة الأولى =  $1.0 \times 22.0 = 22.0$  جنيهًا

محيط القطعة الثانية =  $2 \times 3.6 = 7.2$  متراً

تكلفة القطعة الثانية =  $1.0 \times 7.2 = 7.2$  جنيهًا

القطعة الأولى تكلف أكثر

(٨) محيط الشكل = ( طول المستطيل  $\times ٢$  ) + عرض المستطيل

محيط نصف الدائرة

$$= (1.0 \times ٢) + 7.0 + \frac{22}{7} \times \frac{1}{٢} = 11.0 + 7.0 + ٣.٨ =$$

$$14.8 \text{ سم}$$

(٩) محيط الجزء المظلل = طول القطر + محيط نصف الدائرة

$$= 14 + \frac{1}{٢} \times \frac{22}{7} \times 14 = 36 \text{ سم}$$

(١٠) محيط الجزء المظلل =  $7 \times \frac{22}{7} + 7 \times \frac{22}{7} + 14 \times \frac{22}{7} = 88$  سم

(١١) محيط الجزء المظلل = محيط المربع + محيط الدائرة

$$= 7 \times \frac{22}{7} + 7 \times ٤ = 56 \text{ سم}$$

(٣) صورة الشكل م ب ح ء بالانعكاس فى ل هي م ب ح ء

(٤) ارسم بنفسك ، [١] الشكل م ب ح ء يسمى مستطيل

[٢] محيط الشكل م ب ح ء =  $(3 + 0) \times 2 = 16$  وحدة طول

[٣] مساحة الشكل م ب ح ء =  $3 \times 0 = 10$  وحدة مساحة

(٥) ارسم بنفسك ، [١] الشكل م ب ح ء يسمى مربع

[٢] محيط الشكل م ب ح ء =  $4 \times 4 = 16$  وحدة طول

[٣] مساحة الشكل م ب ح ء =  $4 \times 4 = 16$  وحدة مساحة

[٤] م' (٨، ٥) صورة م ، ب' (٨، ٩) صورة ب

ـ صورتها هي نفسها ، ء صورتها هي نفسها

إذن : المربع م ب ح ء صورة المربع م ب ح ء

(٦) ارسم بنفسك ، [١] شبه منحرف

[٢] مساحة د و م ح =  $\frac{1}{2} \times 4 \times 8 = 16$  وحدة مساحة

[٣] مساحة د و ب ء =  $\frac{1}{2} \times 6 \times 6 = 18$  وحدة مساحة

[٤] مساحة الشكل م ب ح ء = مساحة د و ب ء - مساحة د و م ح

$= 18 - 16 = 2$  وحدة مساحة

### الوحدة الخامسة الإحصاء

#### الدرس الأول : تجميع البيانات

(١) أكمل الجدول بنفسك ، [١] ٦٨ [٢] الأربعاء [٣] الخميس

(٢) أكمل الجدول بنفسك ، [١] الرياضى [٢] الثقافي

$$9 = 24 - 40 \quad 16 = 29 - 40 \quad [٣]$$

$$21 = 24 - 40 \quad [٥]$$

(٧) [١] م [٢] ه ب [٣] ه ب [٤] د ه ب ح

[٥] د ه ب ح [٦] س (ه ح ب ) .... =

(٨) [١] ب ه و [٢] ح و [٣] ب و [٤] ئ و

### الدرس الثاني : تحديد مواضع أعداد على شعاع

(٠) [١] ٦ [٣] ٦ - ٣ = ٣ [٤] حدد بنفسك

= [٨] ٩ [٦] ٩ - ٦ = ٣ [٧] ٦ - ٣ = ٩

(١) [١] حدد بنفسك [٢] حدد بنفسك [٣] النقطة ب (٥، ٩)

(٢) [١] النقطة د (٢، ٥) [٢] النقطة ب (٥، ٩)

[٣] النقطة ح (٢، ٥) [٤] م ح = ٤ وحدة طول

[٥] ب ح = ٧ وحدة طول

[٦] مساحة د ب ح =  $\frac{1}{2} \times 4 \times 7 = 14$  وحدة مساحة

[٧] صورة م بالانعكاس فى المستقيم ل هي م' (١، ١)

[٨] صورة د ب ح بالانعكاس فى ل هي ب' (١، ١)

(٩) [١] النقطة ب (٧، ٩) [٢] النقطة د (٩، ٦)

[٣] النقطة ح (٢، ٩) [٤] النقطة ئ (٤، ٦)

(٥) ئ = ٥ وحدة طول [٦] الشكل م ب ح ء يسمى متوازى أضلاع

[٧] مساحة الشكل م ب ح ء =  $3 \times 5 = 15$  وحدة مساحة

[٨] صورة م بالانعكاس فى ل هي م' (٤، ٩)

[٩] صورة ب بالانعكاس فى ل هي ب' (١، ٧)

[١٠] صورة ح بالانعكاس فى ل هي ح' (١، ٢)

[١١] صورة ئ بالانعكاس فى ل هي ئ' (٤، ٤)

$$11 = 4 + 7 \quad [٣] \quad 20 = 12 + 8 \quad [٢]$$

[٤] مثل بنفسك  
٣٥ [٣] ١٣ [٢] ٧ [١] (٥)

الدرس الثالث : قراءة الجداول و الرسوم البيانية

$$10. = 10. + 0.. = 3.. - 7.. \quad [١] (٥)$$

$$120 = 120 - 20. \quad [٢] \quad 170 \quad [١] (٥)$$

[٣] على [٢] رشا [٣] سون ، رشا [٤] محمد ، رشا

[٥] على [٦] رشا [٧]

[٨] ٥ [٣] كرة اليد [٤] الأولى

الدرس الرابع : تمثيل البيانات بالدرج التكراري

[٩] ٧٤ [٣] أرسم بنفسك [٢] أرسم بنفسك [٣] أرسم بنفسك

[٤] ١٨ [٣] ١٥ [٢] ٩ [١] (٤)

الدرس الخامس : تمثيل البيانات بالقطاعات الدائرية

[٥]  $\frac{1}{4}$  [٣]  $\frac{1}{3}$  [٢]  $\frac{1}{2}$  [١] (٥)

[٦] ٤ [٣] ٣ [٢] ٤ [١] (٥)

[٧]  $\frac{1}{8}$  [٥]  $\frac{1}{4}$  [٣]  $\frac{1}{6}$  [٢] ... [١]

[٨] مثل بنفسك ، [٣]  $\frac{1}{5}$  [٢]  $\frac{1}{7}$  [١]

[٩] ١٨. =  $\frac{1}{3} \times 72.$  [٤] ٥٤. =  $\frac{2}{3} \times 72.$  [٣]  $\frac{1}{4} \times 72.$

[١٠]  $380 = 120 - 0..$  [٣] ٥٠.. [٢] ٥٠.. [١] (٥)

[١١]  $280 = 320 - 0.. = (10. + 17.) - 0..$  [٤]

[١٢] الرياضيات [٢] التربية الفنية [٣] لغة انجليزية [٤] ٩ [٥] (٥)



الدرس الثاني : تنظيم و عرض البيانات

[١] (١) أكبر قيمة = ٢٠. [٢] أصغر قيمة = ٣٠

[٣] المدى = ٣٠ - ٠. = ٣٠

[٤] كون جدول التفريغ بنفسك

المجموعات	المجموع
٣٠. ٠ ٦ ٧ ٠ ٣ ٤	- ٤٠ - ٤٠ - ٣٥ - ٣٠ - ٢٥ - ٢٠ - ٠

[٥] مثل بنفسك

[٦] (١) أكبر قيمة = ٣٠ [٢] أصغر قيمة = ٠.

[٧] (٣) المدى = ٣٠ - ٠. = ٣٠

[٨] كون جدول التفريغ بنفسك

المجموعات	المجموع
٤٠. ٦ ٦ ٠ ١٣ ١٠	- ٤٧ - ٤٤ - ٤١ - ٣٨ - ٣٥ - ٣٠

[٩] مثل بنفسك

[١٠] (١) أكبر قيمة = ١٤ [٢] أصغر قيمة = .

[١١] (٣) المدى = ١٤ - . = ١٤

[١٢] كون جدول التفريغ بنفسك

المجموعات	المجموع
٥٠. ٦ ٨ ١٦ ١٤ ٦	- ١٢ - ٩ - ٦ - ٣ - ٠

[١٣] مثل بنفسك

[١٤] (٤) ٩ = (٤ + ٧ + ١٢ + ٨ - ٤)